



1. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 04.03.2019 14:00 - Zaključeno



Kljub mrzlim nočem so naraščajoče dnevne temperature spodbudile razvoj sadnega drevja. Razvoj poteka hitro in tudi v hladnejših legah so predvsem koščičaste sadne vrste že začele z brstenjem. Močno nabrekle brste imajo tudi že nekatere sorte hrušk, na toplejših legah brstijo tudi nekatere sorte jablan.

V času brstenja koščičarjev je zelo priporočljiva **preventivna raba bakrovih pripravkov**, s katerimi preprečujemo okužbe brstov s povzročitelji bolezni kot so **listna luknjičavost koščičarjev**, **breskova kodravost**, **rožičavost češpelj**, razne vrste **monilij** ter nekatere druge glive in bakterije, ki prezimujejo v ali na lesu, kot je npr. **bakterijski ožig koščičarjev**. Pripravke na osnovi bakra uporabite v suhem vremenu pred napovedanimi padavinami.

Učinkovitost rabe fungicidov bo boljša, če bodo v nasadu opravljeni tudi preventivni ukrepi za varstvo rastlin. V času rezi in po njej je zelo pomembno dosledno odstranjevanje mumij iz krošenj.

V času brstenja sadnega drevja je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in na novo izlegle nimfe nekaterih škodljivcev kot so **listne uši**, **kaparji**, **pršice** in nekateri drugi. Predpomladansko škropljenje s parafinskim oljem je potrebno opraviti v času odganjanja, do fenofaze BBCH 53 (Odpiranje brsta: luske razprte, vidni do svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravka kot sta **Frutapon** in **Ovitex**.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 04.03.2019 14:00

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

