

16. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.1 - 08.03.2019 11:40 - Zaključeno



Jablane so na najbolj zgodnjih legah že dosegle fenološko fazo C - C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53-54.

Pregled zimskih plodišč **jablanovega šklupa** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih že delno dozorele, vendar ob dosedanjih padavinah izbruhov askospor na lovilcu spor Mycotrap še nismo zaznali, kar pomeni, da okužbe ni bilo. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokro vsaj 15 ur (pri povprečni temperaturi zraka 10°C) ali več pri nižjih temperaturah in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno, kar bo po našem mnenju mogoče šele ob koncu prihodnjega tedna.

O rednih terminih zatiranja jablanovega šklupa vas bomo pravočasno obvestili.

Na posameznih lokacijah smo ob pregledu brstov jablan že v začetku tedna zabeležili prve nabodene brste od **jablanovega cvetožera**, vendar še brez odloženih jajčec. Ob zadnjih kontrolnih pregledih pa smo že našli do 50% nabodenih brstov in tudi že prva odložena jajčeca. Priporočamo, da pregledate predvsem tiste nasade, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in sorte, ki so v tem obdobju že v fenološki fazi C - C₃. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste iz dreves v bližini gozda in v primeru, da je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku), priporočamo uporabo pripravka **Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha**. Jablane se lahko tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja (uporaba dovoljena enkrat v eni rastni dobi). Pripravek je strupen za čebele, zato je potrebno pred njegovo uporabo cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.

Po izkušnjah iz tujine priporočajo zniževanje pH vrednosti škropilne brozge, katere vrednost za optimalno delovanje pripravka Imidan 50 WG naj znaša med 6 – 6,5.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 08.03.2019 11:40

Obvestilo prognoističnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

