

5. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV - 13.03.2019 15:22 - Zaključeno



Češnje, višnje in slive so v razvojni stopnji nabrekanja cvetnih brstov (51-54 po lestvici BBCH).

Za preventivno zaščito pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** svetujemo nanos pripravkov na osnovi bakra: **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2,0 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2,0 – 3,0 kg/ha) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 13.03.2019 15:22

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

