

9. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 21.03.2019 13:59 - Zaključeno



V nasadih breskev se odpirajo čašni listi, zgodnje sorte prehajajo v balonski stadij (57 – 59 po lestvici BBCH).

Z začetkom cvetenja svetujemo varstvo proti **cvetni moniliji**. Uporabite lahko pripravke kot so: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha; tudi za ekološko pridelavo), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha; oz. 0,2 l/ha na meter višine krošnje), **PROLECTUS** (1 kg/ha; oz. 330 g/ha na meter višine krošnje), **SIGNUM** (0,75 kg/ha; oz. 0,25 kg/ha na meter višine krošnje) ali **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha; oz. 0,08% konc.).

Drevesa pred **breskovo kodravostjo** zaščitite z enim od pripravkov: **SYLLIT 400 SC** (2,25 l/ha; tretiranje do konca cvetenja), **SYLLIT 544 SC** (1,65 l/ha; tretiranje do konca cvetenja) ali **THIRAM 80 WG** (3 kg/ha; zaloge v uporabi do 30.04.2019)

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 21.03.2019 13:59

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

