

## 9. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 21.03.2019 14:52 - Zaključeno



Hladno vreme v tem tednu je nekoliko upočasnilo fenološki razvoj vseh sadnih vrst.

Današnje jutro je bilo najbolj hladno.

Jutranji mraz je gotovo glede na fenološko fazo najbolj prizadel marelice, delež poškodovanih cvetov lahko pričakujemo tudi pri breskvah in nektarinah.

Minimalne jutranje temperature na viši 2 m so bile na opazovanih sadjarskih lokacijah naslednje: Ponikava – 4,6 °C, Braslovče – 3,4 °C, Kasaze – 3 °C, Slovenske Konjice – 1,2 °C, Črnova – 1,1°C in Bistrica on Sotli 0,8 °C.

Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine v povprečju na opazovane lokacije v fenološki fazi rožnatih popkov E (BBCH 57) in na izpostavljenih legah vstopajo v fazo balonskega stadija E2. (BBCH 59).

Ob koncu tedna lahko pričakujemo glede na napoved toplejšega vremena hitrejši razvoj. V primeru, pogostih padavin in ploh v začetku naslednjega tedna, opravite prvo škropljenje proti cvetni moniliji, ko bo odprtih več kot 10 % cvetov. Drugo škropljenje opravite, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko naslednje pripravke: **Amylo -X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Luna experience** (0,6 L/ha), **Switch 62,5 WG** (1 kg/ha), **Prolectus** (1kg/ha) ali **Signum** (0,75 kg/ha).

Našteti pripravki niso nevarna za čebele, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo, da škropljenje opravite v večernem času. Upoštevajte tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 21.03.2019 14:52

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

