



25. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 22.03.2019 11:42 - Zaključeno



Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na izpostavljenih legah nasadi **češenj** in **višenj** ter **sliv** in **češpelj** začenjajo cveteti. Ko bo odprtih približno 10 % cvetov je potrebno opraviti zatiranje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite pripravke iz spodnje preglednice.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Uporaba dovoljena za
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha	koščičarje
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha	slive
Duaxo koncentrat	1,1 l na višinski meter krošnje na hektar; najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 l/ha	češnje, višnje
Luna Experience	najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha (0,2 l na 1 m višine krošnje na ha)	češnje, višnje, slive
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha	češnje, slive
*Serenade Aso	8 l/ha	češnje, slive
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha	češnje, višnje, slive
Teldor SC 500	0,5 l/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek 1,5 l/ha	češnje
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha	češnje, slive

*Pripravka sta dovoljena v ekološki pridelavi.

Nasadi **breskev** in **nektarin** so v polnem cvetenju. Pred napovedanimi padavinami je priporočljivo opraviti ponovno škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni na breskvah in nektarinah lahko uporabite naslednje pripravke.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
*Amylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	najvišji dovoljeni odmerek 0,6 l/ha (0,2 l na 1 m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha

*Pripravek Amylo-X se lahko uporablja v ekološki pridelavi.

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 22.03.2019 11:42

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024