



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Koščičarji

/ 25. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV (Cvetna monilija)

25. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV (Cvetna monilija) - 01.04.2019 12:36 - Zaključeno



Varstvo češenj in višenj:

Češnje in višnje so v SV Sloveniji v različnih fenoloških fazah, od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) do faze cvetenja (BBCH 65). Priporočamo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji** v času, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov: **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na meter višine krošnje oz. maks. 3,3 L/ha) ali **Luna experience** (0,2 L/ha na m višine krošnje oz. maks. 0,6 L/ha) ali **Signum** (0,25 kg/ha na m višine krošnje, max. 0,75 kg/ha) ali **Switch 62,5 WG** (v konc. 0,08% oz. maks. 1,0 kg/ha; samo za češnje) ali **Teldor SC 500** (samo na češnji; 0,5 L/ha na 1m višine krošnje oz. maks. 1,5 L/ha) ali **Topsin M** (samo češnja; 1 kg/ha) ali **Serenade ASO** (samo češnja; 8 L/ha) ali **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg na ha) ali **Prolectus** (samo češnje; 330 g na višinski meter krošnje na ha, maks. 1 kg/ha).

Varstvo sliv in češpelj

Slive in češplje so v fenološki fazi od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) pa do polnega cvetenja (BBCH 65). Za zatiranje **cvetne monilije** v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi) priporočamo enega od naslednjih pripravkov: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha; samo na slivi) ali **Luna experience** (samo na slivi; 0,2 L/ha na m višine krošnje oz. maks. 0,6 L/ha) ali **Signum** (samo na slivi v 0,25 kg/ha na m višine krošnje, maks. 0,75 kg/ha) ali **Switch 62,5 WG** (v konc. 0,08% oz. maks. 1,0 kg/ha; samo na slivi) ali **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1m višine krošnje oz. maks. 1,5 L/ha) ali **Topsin M** (samo na slivi; 1 kg/ha) ali **Serenade ASO** (samo na slivi; 8 L/ha) ali **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg na ha) ali **Prolectus** (samo slive; 330 g na višinski meter krošnje na ha, maks. 1 kg/ha) ali **Score 250 EC** (0,22 L/ha).

Za spremljanje populacije **rumene ali črne češpljeve grizlice** priporočamo, da se izobesijo bele lepljive plošče. Samo v primeru, če se je na bele lepljive plošče ulovilo skupno več kot 30 osic, lahko takoj po končanem cvetenju (ko odpade večino venčnih listov) uporabite pripravek **Mospilan 20 SG**.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 01.04.2019 12:36

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

