

22. ZATIRANJE PLEVELOV V ŽITIH - 10.04.2019 13:36 - Zaključeno



Pridelovalcem ozimnih žit, ki še niste opravili škropljenja proti plevelom priporočamo, da to storite takoj, čim bodo vremenske razmere dopuščale. Na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji ozimna žita sedaj večinoma začenjajo s kolenčenjem ali imajo že razvito prvo kolence (odvisno od vrste, lege, sorte, tehnologije pridelave). Pleveli so marsikje veliki in močno konkurirajo žitom za prostor, svetlobo in hranila, hkrati pa postajajo manj občutljivi na delovanje herbicidov. V posevkih, kjer se pojavljajo običajni žitni pleveli kot so mrtva kopriva, njivska vijolica, navadna zvezdica, veronike, plešec in podobni lahko do faze prvega oz. drugega kolenca še uporabite pripravke kot so **Mustang 306 SE**, **Duplosan KV** ali **Sekator OD**, še nekoliko pozneje (najpozneje do razvoja zastavičarja BBCH 37-39) pa herbicide kot so **Axial one**, **Biathlon 4D**, **Boudha**, **Ergon**, **Hussar plus**, **Saracen max** in nekatere pripravke na osnovi aktivne snovi fluroksipir (**Bonaca**, **Flurostar**, **Starane forte**, **Tandus**). Slednji dobro zatirajo smolenec!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 10.04.2019 13:36

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

