



Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Krompir

/ 34. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI

34. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED PLEVELI - 11.04.2019 09:54 - Zaključeno



V nižinah Primorske ste že posadili krompir in bo kmalu že vzkalil (če še ni), v višjih legah pa se šele pripravljate na saditev krompirja. Varstvo pred pleveli v krompirju temelji na mehanskem zatiranju (plitva obdelava tal, osipanje), ki tudi sicer ugodno vpliva na rast krompirja kot okopavino. Mehansko zatiranje plevelov je tudi edino, ki ga lahko uporabijo ekološke kmetije. Pri integrirani pridelavi po potrebi uporabimo tudi herbicide. V prilogi so vsi sedaj registrirani herbicidi za uporabo pred in po vzniku krompirja. Priporočamo, da se pri izbiri herbicida držite navodil o uporabi in ste posebej pozorni na fazo rasti krompirja, da ne bi prihajalo do nepotrebnih fitotoksičnosti in zastojev rasti pri krompirju.

SEZNAM HERBICIDOV V KROMPIRJU 2019

PRED VZNIKOM KROMPIRJA

PRIPRAVEK	ODMEREK	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE	K
STOMP AQUA* Pendimetalin - 45,5% Do 31.7.2019	2,9 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere vrste širokolistnega plevela Tretiramo pred vznikom	Seme mora biti dobro prekrito z zemljo. Snovi ni dovoljeno uporabljati v tleh, ki imajo organske mase nad 6%	ČU
ACTIVUS 40 WG* Pendimetalin - 40%	5,0 kg/ha	Za enoletne ozkolistne in nekatere širokolistne plevela Tretiramo pred vznikom krompirja	Vamostni pas 40 mod voda 1. in 2. Reda Zaloge v uporabi: 12.8.2019	ČU
SHARPEN 33 EC* Pendimetalin- 33% Do 31.7.2019	3,0-5,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov	Vamostni pas 30 mob vodah 1. reda in 2. reda. Ne tretira se posevka, ki je v stresu. Slabo zatira slak.	ČU
SHARPEN 40 SC* Pendimetalin- 40% Do 31.7.2019	2,5-4,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Tretira se pred vznikom, po oblikovanju grebenov	Slabo zatira slak. Vamostni pas 30 mob vodah 1. reda in 2. reda.	ČU
STALLION SYNC TEC* Klomazon -3% + pendimetalin- 33,3% Do 31.7.2019	3,0 l/ha	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pimice Tretiramo čim prej po saditvi do najpozneje 7 dni pred vznikom	Seme mora biti dobro pokrito z zemljo (najmanj 25 mm). Ne sme se uporabljati v semenskem krompirju. Vamostni pas 20 m do vodnih površin.	ČU
METRIC* Klomazon – 6% + Metribuzin- 33,3%	1,5 l/ha	Srakonja, pasje zelišče	Uporabljamo pred vznikom. Ne smemo uporabljati na tleh, kjer je več kot 10% organske snovi	ČU
	1,0 l/ha	Za zatiranje ostalih enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov		
SENCOR SC 600*	0,75 l/ha	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni pleveli	Vamostni pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda	42 dni

Metribuzin-60%		Po sajenju pred vznikom		
BUZZIN* Metribuzin -70 %	0,75 kg/ha	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaj vrst ozkolistnega plevla Tik pred vznikom	Kolobame omejitve!	ČU
PLATEEN WG 41,5 * Flufenacet -24% + metribuzin-17,5%	2,0 – 2,5 kg/ha	Za enoletne ozkolistne in širokolistne plevle Pred vznikom krompirja	Varnosti pas 15 m od voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda	ČU
BOXER* Prosulfokarb - 80% do 31.10.2019	5,0 l/ha	Za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevla Tik pred vznikom	Ne obdelujemo zemlje, dokler krompir ne vznikne	ČU
PROMAN Metobromuron 50%	3,0 l/ha	Za zatiranje enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Tretiramo samo pozne in srednje pozne sorte (z več kot 115 dni rasti)	Varnostni pas 15 m od voda 1. reda in 10 m od voda 2. reda. Tretiranega krompirja ne smemo uporabljati za krmno živali! Kolobarne omejitve!	ČU
CHALLENGE Aklonifen – 60 %	4 l/ha	Za širokolisten in nekaj ozkolistnih plevelov Po saditvi pred vznikom krompirja	Varnostni pas 20 m od voda 1. in 2. reda	90 dni

PO VZNIKU KROMPIRJA

PRIPRAVEK	ODMEREK	DELOVANJE, UPORABA	OPOMBE	K
SENCOR SC 600 * Metribuzin-60%	0,15 l/ha	Enoletni širokolistni in nekateri ozkolistni plevli Po vzniku krompirja, ko je na glavnem stebelu največ 9 listov (do BBCH 19).	V primeru naknadnega vznika plevla se ponovno tretira (razmak 10-14 dni) V fazi od kličnih listov do 2 listov plevla	42 dni
TAROT 25 WG* Rimsulfuron-25 %	40,0 g/ha + močilo	Za zatiranje širokolistnega ter enoletnega ozkolistnega plevla razen navadne kostrebe	Zatiramo v fazi od 3 listov do najpozneje v stadiju začetka sklepanja vrst krompirja. Tretiramo, ko ima plevel 2-3 liste	ČU
	50,0g/ha + močilo	Za zatiranje širokolistnega in enoletnega (tudi n. kostreba) ter večletnega ozkolistnega		
BASAGRAN do 30.6.2019 BASAGRAN 480* Bentazon -48%	1,5-2,0 l/ha	Za zatiranje eno – in večlet. širokolistnega plevla. Uporabljamo, ko je krompir visok največ 10 cm	temperatura zraka naj ne presega 25 °C; Za dobro delovanje je potrebno omočiti liste in steblo	42 dni

GRAMINICIDI – HERBICIDI PROTI TRAVNIM PLEVELOM

ZETROLA = AGIL 100 EC* Propakvizafop - 10%	0,75 – 1,5 l/ha	Za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov V fazi od 3 lista do faze popolne razraščanosti krompirja	Enoletne trave naj bodo v razvojni fazi od 2 listov do sredine razraščanja (5 stranskih poganjkov) V zgodnjem krompirju uporaba ni dovoljena!	30 dni
FOCUS ULTRA* Cikloksidim – 10%	2,0 l/ha ali 1,0 l/ha + 1,0 l/ha močila	Enoletni ozkolistni pleveli in samosevna žita	Tretiramo v fazi od 2 do 9 listov krompirja Varnostni pas 15 mod voda 1. reda in 5 m od voda 2. reda	56 dni
	4,0 l/ha ali 2,0 l/ha + 2,0 l/ha močila	Večletni ozkolistni pleveli		
TARGA SUPER * Kvizalofop-p-etil- 5%	1,2 l/ha	Enoletni ozkolistni pleveli Od 2 lista do začetka cvetenja krompirja	Tretiranje enoletnih ozkolistnih plevelov od 2 pravih listov do konca razraščanja.	45 dni
	2,0 l/ha	Plazeča pirnica	Tretiranje v razvojni fazi od 4 do 6 listov plevela	
FUSILADE FORTE * Fluazifop-p-butil- 15 %	0,8 l/ha	Enoletni ozkolistni plevel	Uporabljamo po vzniku, ko je plevel v fazi 2-4 listov Varnostni pas 20 mod voda Datum veljavnosti 31.12.2019.	90 dni
	1,3 l/ha (s predhodno obdelavo tal)	Večletni ozkolistni plevel (divji sirek)		
	1,5 l/ha	Večletni ozkolistni plevel (pirnica, pesjak)		

K – karenca, **ČU** – zagotovljena s časom uporabe. Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 10.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI !

Pri herbicidih, kjer je opozorilo o kolobarnih omejitvah, je potrebno v navodilu o uporabi to še posebej preveriti in upoštevati pri setvi naslednjih kultur.

Pridelovalce zgodnjega krompirja opozarjamo, da imajo nekateri herbicidi (npr. herbicidi za zatiranje travnih plevelov) dolgo karenco ali pa niso dovoljeni v zgodnjem krompirju (Agil in Zetrola).

Datum objave obvestila: 11.04.2019 09:54

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

