



30. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.2 - 11.04.2019 11:14 - Zaključeno



Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 7 do 8 po skali BBCH (začetek odpiranja brsta - odpiranje brsta). To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so 'Chardonnay', 'Rumeni muškat' in 'Rizvanec'. Ostale sorte npr. 'Laški rizling' so šele v fenološki fazi BBCH 5 (stadij volne).

Ko vinska trta doseže fenološko fazo 8 po skali BBCH (konice zelenih poganjkov jasno vidne), je čas za prvo škropljenje proti **črni pegavosti**. Glivica je prisotna predvsem na občutljivih sortah kot so 'Laški rizling', 'Šipon', 'Rizvanec' in 'Kerner'. Do okužb prihaja samo v primeru deževnega vremena v začetku rasti mladice. Proti **črni pegavosti vinske trte** je potrebno običajno opraviti dvojno škropljenje, prvič, ko mladice dosežejo velikost 1 do 2 cm in drugič v primeru deževnega vremena čez približno 7 – 10 dni. Škropljenje je potrebno opraviti pred začetkom padavin. Proti črni pegavosti priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov kot so: **Antracol** ali **Antracol WG 70** (oba v 0,2% konc., zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali **Follow 80 WG** (1,9 kg/ha) ali **Folpan 50 SC** (3 L/ha) ali **Folpan 80 WDG** (1,9 kg/ha) ali **Polyram DF** (3 kg/ha).

Proti črni pegavosti je mogoče je uporabiti tudi bakrove pripravke in sicer **Cuprablau Z 35 WG** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha) ali **Cuprablau Z Ultra WP** (1,8 kg/ha). Škropimo samo močnejše okužene vinograde pred napovedanimi padavinami.

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močnejše pojavil **oidij**, lahko namesto zgoraj omenjenih pripravkov proti črni pegavosti uporabite pripravek **Universalis** (2,0 L/ha).

Trsno kodravost ali **akarinozo** in **erinozo** lahko zatiramo tudi kasneje v fenološki fazi, ko so mladice dolge 2 do 5 cm (BBCH 12- 14) s pripravkom **Vertimec pro** v 0,1% konc.

Prve metuljčke **grozdnih sukačev** smo na področju SV Slovenije na feromonske vabe ujeli 8. aprila. Priporočamo, da se izobesijo feromonske vabe za spremljanje križastega in pasastega grozdnega sukača, še posebej za tiste vinogradnike, ki so vključeni v KOPOP ukrep »VIN-VABE«.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 11.04.2019 11:14

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

