

26. ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU - 19.04.2019 10:46 - Zaključeno



Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so ozimni ječmeni sedaj v razvojnem stadiju kolenčenja, razvita imajo pretežno dva do tri kolenca, zgodnejše sorte so v fazi zastavičarja. Posevki so po večini razmeroma zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljati znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (*Septoria nodorum*). V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opazate ali samo posamezne pegice in nameravate ječmen škropiti samo enkrat priporočamo, da z rabo fungicidov še nekoliko počakate. V posevkih, kjer so okužbe opazne na večini rastlin pa priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Priporočamo rabo katerega izmed pripravkov kot so **Archer max**, **Amistar opti**, **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Prosaro**, **Seguris xtra**, **Zantara** in podobni.

V posevkih žit smo opazili tudi hrošče rdečega žitnega strgača in odložena jajčeca, ličink pa še ne, zato dodajanje insekticida za sedaj še ni smiselno!

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 19.04.2019 10:46

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

