

28. ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU - 19.04.2019 10:48 - Zaključeno



Razvoj ozimnih ječmenov je različen, odvisno od območja pridelave, sorte in tehnologije pridelave. V hladnejših legah rastline pretežno še kolenčijo, v toplejših območjih in legah pa je razvoj nekoliko hitrejši. Sušno vreme v marcu je onemogočalo razvoj bolezni, zato so posevki dokaj zdravi, razen v nekaterih sortah so se po zadnjem dežju začela pojavljati znamenja ječmenove mrežaste pegavosti in nekaterih drugih listnih pegavosti (*Septoria nodorum*).

Priporočamo pregledovanje njiv! V posevkih, kjer opazite znamenja okužbe z različnimi pegavostmi na približno polovici rastlin priporočamo, da jih s fungicidi zavarujete čimprej. Uporabite katerega izmed pripravkov kot so **Archer max**, **Amistar opti**, **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Prosaro**, **Seguris xtra**, **Zantara** in podobni.

V posevkih, kjer znamenj bolezni ne opazate ali samo posamezne pegice ali nameravate ječmen škropiti samo enkrat pa priporočamo, da počakate z rabo fungicida do faze BBCH 49 (ko opazite nabrekanje listne nožnice in so konice resic komaj vidne). S škropljenjem v tem obdobju boste zatrli tudi ječmenovo ramularijsko pegavost, ki se pokaže šele po klasenju, vendar je takrat več ni mogoče zatirati.

V posevkih žit spremljajte tudi pojave rdečega žitnega strgača. Dokler opazate samo hrošče in odložena jajčeca, ličink pa ne, dodajanje insekticida ni smiselno. Insekticide uporabite v primeru preseženega praga zatiranja (1 ličinka na bil oz. 10 ličink/m²).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 19.04.2019 10:48

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

