



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Koruza

/ 24. ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI

24. ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI - 25.04.2019 12:03 - Zaključeno



V zadnjih dneh so na področju Savinjske doline in širše Celjske regije začeli s setvijo koruze. Trenutno je pri nas registriranih 70 selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi. Ukrepi uporabe herbicidov se tako kot pri drugih gojenih rastlinah, tudi pri koruzi počasi, a vztrajno nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevelov.

Svetujemo vam, da s herbicidi navedenimi v spodnji preglednici »kolobarite« kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih čim večkrat zamenjate s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin.

Priporočamo, da poskušate zatiranje plevelov pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem plevelov po vzniku koruze.

Za več informacij in lažjo odločitev prilagamo preglednico št. 1.

Preglednica 1: Seznam selektivnih herbicidov, registriranih v RS za uporabo v koruzi v letu 2019

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevel	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
ACTIVUS 40** E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	WG	4,0 kg/ha	Preem, Po 12-14	KZ in KS 45 dni, VPV, **zaloge v uporabi do 12.8.2019
ADENGO E.Š. in O. pl.	izoksaflutol + tienkarbazon	SC	0,44 L/ha	Preem, Po do 13	KZ=ČU, KS ne silirati pred mlečno zrelostjo
*AKRIS, E. O. in E. Š. pl.	dimetenamid + terbutilazin	SE	3,0 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV
*ALISEO, E. in Večl. O. ter Š. pl.	nikosulfuron + rimsulfuron	WG	70 g/ha	Po 12-18 + M	ČU, KZ in KS
*ALISEO PLUS E in Večl. O. ter Š. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	350 - 440 g/ha	Po 12-16 + M	ČU
*ARIGO E in Večl. O. ter Š. pl.	mezotrión + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	330 g/ha	Po 12-18 + M	ČU
*ARRAT, E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	0,2 kg/ha	Po 12-16 + M	ČU, VPV
*BANDERA =	nikosulfuron	OD	1,0 L/ha	Po 12-18	ČU, KZ in KS
*PRIMERO, O. in Š. pl.					
*BANVEL 480 S E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,4-0,7 L/ha	Po 13-16	ČU
*BASAGRAN 480, *BASAGRAN** E in nek.Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-16	KZ in KS 60 dni, ** zaloge v uporabi do 25.8.2020
BROMOTRIL 225 EC** E. Š. pl.	bromoksinil	EC	1,0-1,5 L/ha	Po 12-14	ČU, VPV, **zaloge v uporabi do 12.8.2019
*CALARIS PRO E.Š. in nekatere vrste O. pl.	mezotrión + terbutilazin	SC	2,0 – 2,3 L/ha	Preem, Po 09-14	ČU, VPV
*CALLAM, E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	300 g/ha	Po 13-16 + M	ČU, ne za sladko koruzzo!

CALLISTO 480 SC Š. pl. in navadna kostreba	mezotrión	SC	0,25 – 0,3 L/ha 0,15 – 0,25 L/ha	Preem, Po 09-18 + M	ČU
*CAMBIO, E. in Večl. Š. pl.	bentazon+dikamba	SL	2,0-3,0 L/ha	Po 12-17 + M	KS 40 dni, KZ 63 dni, VPV
CAPRENO O. in Š. pl.	tembotrión + tienkarbazon-metil	SC	0,3 L/ha	Po 12-16 + M	ČU
*CLOPHAR 600 SL E. in Večl. Š. pl.	klopiralid	SL	0,16 – 0,2 L/ha	Po 12-15	70 dni
*DICASH, E. in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L/ha	Po 12-18	ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,5 L/ha 1,0 - 1,3 L/ha	Preem izven WO Po 09 -14	KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotrióna</i> + M
*ERICA 960 EC E. O. in nekatere vrste Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,5 L/ha 1,0 - 1,3 L/ha	Preem izven WO Po 09 -14	KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotrióna</i> + M
*ELUMIS, E. Š. in O. pl.	mezotrión + nikosulfuron	OD	1,5 L/ha	Po 11-18	ČU
*ENTAIL = *MILAGRO 240 SC O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	0,17 L/ha	Po 12-18	ČU
EQUIP, Š. in O. pl	foramsulfuron	OD	2,0 - 2,5 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV
ESTERON, E. Š. pl.	2,4 D 2-EHE	EC	1,0 L/ha	Po 14-16	ČU
FOCUS ULTRA, E in Večl. O. pl, samonikla žita	cikloksidim	EC	1,0 – 4,0 L/ha	Po 12-19	Samo v posevkih tolerantrih na a.s. cikloksidim!
*FRONTIER X2, E. O. in Š. pl.	dimetenamid -P	EC	1,0 - 1,4 L/ha	Preem	KZ =ČU, KS v mleč. zrelosti
HARMONY 50 SX, Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	22,5 g/ha	Po 12-18 + M	ČU
HERBOCID XL Š. pl.	2,4-D	SL	1,25 L/ha	Po 13-14	ČU
*KALIMBA = *KAMBA 480 SL E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L/ha	Po 12-18	ČU
*KELVIN, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 13-18	ČU
*KELVIN OD, Š. in O. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L/ha	Po 14-17	ČU
*KOBAN TX, Š. in O. pl.	petoksamid + terbutilazin	SE	4,0 L/ha	Preem, Po 09-14	ČU, VPV
LAUDIS, O. in Š. pl.	tembotrión	OD	1,15 - 2,25 L/ha	Po 12-18	ČU, VPV, mogoča split aplik.
LAUDIS WG30, O. in Š. pl.	tembotrión	WG	0,25 - 0,5 kg/ha	Po 12-18 + M	ČU, mogoča split aplikacija
*LONTREL 100, Š. pl.	klopiralid	SL	1,0 - 1,2 L/ha	Po 12-15	KZ in KS 70 dni
*LONTREL 72SG, Š. pl.	klopiralid	SG	170 g/ha	Po 12-19	ČU
*LUMAX E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrión	SE	3,25 - 4,0 L/ha 3,0 - 4,0 L/ha	Preem izven WO Po 09-14	ČU
*LUMAX H 537,5 SE E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin	SE	3,0 - 4,0 L/ha	Preem, Po 09-14	ČU, VPV

	+ mezotrión				
MAISTER OD** O. in Š. pl.	foramsulfuron + jodosulfuron-metil natrij	OD	1,5 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV, **zaloge v uporabi do 4.7.2019
MERLIN FLEXX E. Š. in nekat. O. pl.	izoksaflutol	SC	0,3 L/ha 0,4 L/ha	Preem, Po 09- 13	KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr. Po - le samostojno!
MONSOON ACTIVE E.O. in Š.pl. (ter diyji sirek)	foramsulfuron + tienkarbazon-metil	OD	1,5 L/ha ali 0,75 + 0,75 L/ha (2,0 L/ha ali 1,0 + 1,0 L/ha)	Po 12-16 Po 12-18	ČU, VPV, deljena aplikac. mogoča deljena aplikacija
*MILAGRO EXTRA 6 OD = *MOTIVELL EXTRA 6 OD = *SAMSON EXTRA 6 OD = *KELVIN MAX, O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L/ha ali deljena aplikac. 0,5 + 0,25 L/ha	Po 12-18	ČU, ne za sladko korozo!
*MOTIVELL = *SAMSON 4 SC, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 12-18	ČU, ne za sladko korozo!
*MURAL E in nekatere vrste Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 – 0,75 L/ha	Po 12-15	ČU, ne za semensko, ne za sladko in ne za korozo s podsevkom!
MUSTANG 306 SE E. in nekat. Večl. Š. pl.	florasulam + 2,4 D 2-EHE	SE	0,5 - 0,6 L/ha	Po 14-15	ČU
NAGANO, Š. in O. pl.	bromoksinil + mezotrión	OD	0,5 – 1,0 L/ha	Po 12-18	ČU
*NICOSH, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 12-18	KZ in KS 60 dni
*NIKITA=(*CALLISTO TURBO) E ter Večl. Š. in O. pl.	dikamba + mezotrión + nikosulfuron	WG	0,45 kg/ha ali deljeno 0,4 + 0,2 kg/ha	Po 12-19 + M Po 12-16 + M + Po 19 + M	ČU; v primeru deljenega odmerka le vsako drugo leto na isti površini!
OSORNO = TEMSA SC navadna kostreba in nekat. Š. pl.	mezotrión	SC	1,5 L/ha	Po 12-18	ČU
PEAK 75 WG E. in nekat. Večl. Š. pl.	prosulfuron	WG	20 g/ha	Po do 17 + M	ČU
*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin	SC	4,0 - 4,5 L/ha solo	Preem izven WO Po 09-13	ČU, v kombinaciji s sredstvom na osnovi mezotriona so odmerki nižji!
SHARPEN 40 SC, E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU, KZ in KS
SHARPEN 33 EC, E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU, KZ in KS
*SPANDIS E. in Večl. Š. ter O. pl.	dikamba + nikosulfuron + prosulfuron	WG	400 g/ha	Po 12-18 + M	ČU
STARANE FORTE E. in nekat. Večl. Š. pl.	fluoksipir	EC	0,54 L/ha	Po 12-16	ČU, KZ, KS in za sladko korozo
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	3,3 L/ha	Preem, Po do 14	ČU

* SUCCESSOR 600 , O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L/ha	Preem, Po do 14	ČU, VPV
* SUCCESSOR 600 PRO** Š. in O. pl.	petoksamid	EC	2,0 L/ha	Preem	ČU, VPV, **zaloge v uporabi do 31.7.2020
* TALISMAN , E. in nekat. Večl. O. pl. ter E. Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,125 L/ha	Po 12-18	ČU, KZ in KS
TANDUS 200 EC E. in Večl. Š. pl.	fluroksipir	EC	1,0 L/ha	Po 13-16	KS 63 dni, registriran le za uporabo v silažni koruzi!
* TAROT 25 WG O. in Š. pl.	rimsulfuron	WG	40 - 60 g/ha	Po 12-18 + M	KS 63, KZ=ČU, ne uporabljati na kraških in propustnih tleh!

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza koruze (npr. BBCH 12) = razvita dva lista koruze, **Po + M** - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe,

KS – silažna koruza, **KZ** – koruza za zrnje, **VPV**- varnostni pas do voda, FFS** zaloge v uporabi do...

***FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!

Datum objave obvestila: 25.04.2019 12:03

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

