## 27. VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI - 26.04.2019 12:36 - Zaključeno

Fižol se v teh dneh seje oziroma so posevki že v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevele | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe fižol BBCH | Karenca in opombe |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOXER**<br>O. in Š. pl. | prosulfokarb | EC | **5,0 L/ha** | Preem | ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm) |
| **CHALLENGE**<br>Š. in O. pl. | aklonifen | SC | **4,0 L/ha** | Preem<br>BBCH 00-08 | 90 dni, za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh |
| **STOMP AQUA**<br>E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | CS | **2,9 L/ha** | Preem | ČU,<br>**manjša uporaba** |

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevele | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe fižol BBCH | Karenca in opombe |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGIL 100 EC**<br>E. in Večl. O. pl | propakvizafop | EC | **0,75 – 1,5 L/ha** | Po 13-29 | 60 dni |
| ***BASAGRAN 480**,<br>***BASAGRAN****<br>E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon | SL | **1,0 - 2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji**<br>**(1,0 + 1,0 L/ha),** med aplikacijama<br>naj bo 7-14 dni | Po,<br>do višine posevka največ<br>5 cm | 42 dni,<br>tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 °C!<br>**zaloge v uporabi do 25.8.2020 |
| **FOCUS ULTRA**<br>E. O. in samosevci žit<br><br>Večl. O. pl. | cikloksidim | EC | **2,0 L/ha** oz.<br>**1,0 L/ha+1,0L/ha**<br>močila DASH HC<br>**4,0 L/ha** oz.<br>**2,0 L/ha+2,0L/ha**<br>močila DASH HC | Po 12-19<br><br>Po 12-19 | 56 dni,<br>enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)<br>večletni oz. pl. visoki do15 cm, oziroma (BBCH 13-15) |
| **ZETROLA**<br>E. in Večl. O. pl | propakvizafop | EC | **0,75 – 1,5 L/ha** | Po 13-29 | 60 dni |

**Legenda:** **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O. –** ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU**- karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!**

***FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

Datum objave obvestila: 26.04.2019 12:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: **Silvo Zveplan**
Seznam registriranih FFS