

36. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT - 29.04.2019 09:02 - Zaključeno



Razvoj ozimnih žit je sedaj zelo hiter, vremenske razmere s pogostimi padavinami pa so ugodne za razvoj in širjenje glivičnih bolezni. Priporočamo redno pregledovanje posevkov.

Če **ječmenov** še niste zavarovali s fungicidom priporočamo, da to storite pred začetkom klasenja. V obdobju, ko so razviti že vsi listi, klas pa še ni viden, temveč so opazne samo konice resic (BBCH 49), boste s primernim fungicidom ječmen preventivno zavarovali tudi pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo. Bolezen se v posevkih pojavlja vsako leto, znamenja okužb pa se pokažejo šele po klasenju, vendar zatiranje takrat ni več mogoče. Uporabite lahko katerega izmed pripravkov kot so **Amistar opti**, **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Prosaro**, **Seguris xtra**, **Siltra xpro**, **Zantara** in podobni.

Kjer pa ste prvo škropljenje s fungicidom že opravili, škropljenje ponovite po preteku približno dveh tednov.

Ozimne pšenice sedaj večinoma še kolenčijo ali zaključujejo s kolenčenjem. V nekaterih posevkih so se po zadnjem dežju na drugem ali tretjem najmlajšem listu začela pojavljati znamenja okužb s pšenično listno pegavostjo, žitne pepelovke in drugih bolezni ne opažamo. Pregledujte posevke! Priporočamo, da škropljenje s fungicidom opravite takoj, ko bo razvit zgornji list -zastavičar (BBCH 39). Ohranjanje zdravega zgornjega lista in dveh listov pod njim čimbolj dolgo, je odločilnega pomena za dober pridelek zrnja. V tem obdobju priporočamo predvsem rabo katerega od dobro učinkovitih novejših fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Seguris xtra** in **Zantara**, lahko pa uporabite tudi kateri drug registriran fungicid.

V posevkih spremljajte tudi razvoj **rdečega žitnega strgača**. Insekticid običajno uporabimo, ko se pojavijo ličinke. Okvirni prag zatiranja je v povprečju 1 ličinka na posamezno bil. Hrošče zatiramo izjemoma, v primeru množičnega pojava. Kritično število je 8-15 hroščev/m². Za zatiranje lahko uporabite katerega od pripravkov kot je **Biscaya**, **Bulldock 25 EC**, **Fastac 100 EC**, **Decis**, **Karate zeon**, **Kaiso EG**, **Karis 10 SC**, **Sparviero**, **Evure** ali **Mavrik 240**.

Pred rabo fitofarmaceutskih sredstev skrbno preberite in upoštevajte priložena navodila!

Datum objave obvestila: 29.04.2019 09:02

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

