



29. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SOJE PRED PLEVELI - 29.04.2019 09:25 - Zaključeno



Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih soje
po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS, DR METROB KLOMAZON nekateri vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na WO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatere vrste Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na WO	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih soje
po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480, E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 °C!
*BASAGRAN**, E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temper. med 10 in 25 °C! **zaloge v uporabi do 25.8.2020
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz. 1,0 L/ha+1,0L/ha	Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)

			močila DASH HC 4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19	večletni oz pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,2 L/ha	Po, s predhodno medvrstno obdelavo tal	90 dni
HARMONY 50 SX , E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija , razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10 - 14	manjša uporaba , SZ = ČU, SZK = 14 dni FFS samo za poklicne pridelovalce soje!

Legenda: **SZ** – soja za zrnje, **SZK**- soja za zeleno krmo

Opozorilo: **Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!**

***FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

FFS** zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 29.04.2019 09:25

Obvestilo prognoističnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

