

55. OBVESTILO O VARSTVU SOLATE - 30.04.2019 11:48 - Zaključeno



Solatna plesen

Zaradi deževnega vremena se na pridelovalnih površinah na prostem kot v zavarovanih prostorih lahko pojavi **solatna plesen**. Bolezen prepoznamo po belkasti prevleki, ki se razvije na spodnji strani listov. V rastlinjaku možnost za pojav bolezni zmanjšamo s prezračevanjem. Dodatno se priporoča tudi odstranjevanje obolelih rastlin. Zatiranje bolezni lahko opravimo s pripravki, ki so navedeni v spodnji preglednici.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
*Anylo-X	1,5 – 2,5 l/ha
*Cuprablau Z 35 WG	1,5 kg/ha
Enervin	2 kg/ha
Gett	2,5 kg/ha
Infinito	1,6 l/ha
Mirador 250 SC	1 l/ha
Ortiva	1 l/ha
Pergado MZ	2,5 kg/ha
Polyram DF	1,2 kg/ha
Previcur Energy	2,5 l/ha (škropljenje v zavarovanem prostoru po presajanju)
Revus	0,6 l/ha
Ridomil Gold MZ Pepite	1,9-2,5 kg/ha
Zaftra AZT 250 SC	1 l/ha
Zoxis 250 SC	1 l/ha

*Priprava se lahko uporablja v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Polži

Na pridelovalnih površinah se pojavljajo **polži**. Na vrtovih škodljivce odstranjujemo ročno ali pa uporabimo mehanske prepreke s katerimi onemogočimo dostop do gojenih rastlin. V okolici gredic lahko posipamo apno, ki izsuši telo polžev. Posipanje po dežju ponovimo. Dodatno lahko polže zatiramo tudi z uporabo limacidnih vab.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Agrosan B - polžomor	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Arion +	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Biotip vaba za polže	4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²)
Carakol	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Celaflor Limex	70 g/100 m ²
Compo Bio sredstvo proti polžem	5 g/m ²
Ferramol	5 g/m ²

Ironmax Pro	7 kg/ha (70 g na 100 m ²)
Kolflor	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Limaks	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Lima Gold 3 %	7 kg/ha (70 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 21 kg/ha (210 g na 100 m ²)
Medal	7 kg/ha (70 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 21 kg/ha (210 g na 100 m ²)
Metarex Inov	5 kg/ha pri tretiranju po celotni površini in v vrsti; 4 kg/ha pri tretiranju v brazde ali ob setvi semena
Polžokill	4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²)
Terminator vaba za polže	7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²)
Terminator Plus vaba za polže	4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²)

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 30.04.2019 11:48
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)

