



Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Pečkarji / 44. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

#### 44. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 20.05.2019 11:42 - Zaključeno



Razvoj jablan in hrušk je zaradi obdobja hladnega in deževnega vremena nekoliko upočasnjen, kljub temu je drevje na večini območij že doseglo fazo razvoja 72 BBCH (plodiči veliki do 20mm). Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej ustvarja ugodne razmere za primarne in tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi povzročitelji bolezni. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preventivnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite **pred napovedanimi padavinami** z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so **Antracol**, **Antracol WG 70** (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), **Avtar 75 NT**, **Delan 700 WG**, **Delan pro**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 WG**, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC** **Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih, kjer s preventivnim pristopom varstva niste bili uspešni in na listju opažate pege škrlupa je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so **Difcor 250 EC**, **Duaxo concentrat**, **Mavita 250 EC**, **Score 250 EC** in **Domark 100 EC**. Omenjenim pripravkom je **zaradi zmanjševanja pojava odpornosti vedno** potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja.

Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi A.S. **kaptan** kot je **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasada. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.

Priporočamo, da v nasadih še naprej spremljate pojav in razvoj škodljivcev kot so listne uši, krvava uš, bolšice, jabolčna grizlica, hruševa brstarica, vejičasti in ameriški kapar idr. V primeru prerazmnožitve katerega od škodljivcev opravite zatiranje z enim izmed registriranih pripravkov. Za škropljenje z insekticidi priporočamo, da škropilni brozgi dodate močilo.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrst!**

Datum objave obvestila: 20.05.2019 11:42

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024