



48. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 29.05.2019 10:34 - Zaključeno



Nadaljevanje nestanovitnega vremena še naprej ustvarja ugodne razmere za primarne in tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi povzročitelji bolezni. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete z varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškopite **pred napovedanimi padavinami** z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so **Antracol, Antracol WG 70** (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), **Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Curatio-žvepleno apnena brozga** ali **Vitisan**, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V nasadih, kjer opazate pege škrlupa je poleg dotikalnih pripravkov priporočljiva uporaba sistemsko delujočih fungicidov kot so **Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat, Mavita 250 EC, Score 250 EC** in **Domark 100 EC**. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojave odpornosti vedno potrebno dodati sredstvo z dotikalnim načinom delovanja.

Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere fungicidno oblogo. V primeru pojave neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi A.S. **kaptan** kot je **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasada. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov. V nasadih kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke lahko uporabite tudi katerega izmed sistemskih pripravkov kot so **Stroby WG, Zato 50 WG, Flint, Sercadis, Sercadis plus, Tercel, Luna experience, Topaze ali Topas 100 EC**. Našteti pripravki delujejo tudi proti jablanovemu škrlupu.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača se precej razlikujejo med sadovnjaki, v hladnejših območjih jih praktično ni. Sadjarjem priporočamo, da skrbno spremljate ulove metuljčkov na feromonske vabe. V nasadih z visokimi ulovi in če so temperature ob sončnem zahodu več dni zaporedoma ugodne za parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30), bodo izpolnjeni pogoji za prvo škropljenje s sredstvi, kot sta **Harpun** in **Insegar 25 WG**, ki morata biti nanešena pred odlaganjem jajčec. Škropljenje opravite le, če sta izpolnjena oba pogoja, pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!

Datum objave obvestila: 29.05.2019 10:34

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

