



## 76. OBVESTILO O VARSTVU KORUZE - 31.05.2019 12:23 - Zaključeno



Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 3-5 listov (10 do 20 cm), na težjih hladnejših tleh pa je rast zastala. Koruze so zaradi hladnejšega vremena in predvsem zaradi močne zbitosti in namočenosti tal v stresu in so občutljivejše za herbicide. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo.

Pri uporabi herbicidov po vzniku koruze v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hладa in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo po vzniku koruze, nekateri herbicidi tudi do 8. lista koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov pripravkov in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi! Posebej priporočamo, da preberete vsa opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevate!

Pripravila: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

## SEZNAM HERBICIDOV PO VNZIKU KORUZE 2019

## SEZNAM REGISTRIRANIH HERBICIDO, KI JIH UPORABLJAMO PO VNZIKU KORUZE IN PLEVLOV, 17. 4. 2019

PRIPRAVEK	ODMEREK /ha	DELOVANJE NA, UPORABA	OPOMBE
<b>BROMOTRIL 225 EC</b> bromoksimil oktanoat 32,75%	<b>1 – 1,5 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze za širokolistne semenske pleveli	po vzniku posevka, <b>za ambrozijo</b> <b>Zaloge v uporabi do 12.8.2019</b>
<b>AKRIS *</b> Dimetenamid 28% + terbutilazin 25%	<b>3 l/ha</b>	Od 2. do 6. Lista koruze  Za enoletne ozko in širokolistne pleveli  Datum veljavnosti do 31.10.2019	
<b>CAMBIO *</b> Bentazon 32% + dikamba 9%	<b>2 l/ha</b> <b>lahko dodamo MOČILO</b>	v fazi 2 – 7 listov, za širokolistne (enoletne in večletne) pleveli	dobro deluje na slak in osat, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.5.2019
<b>BASAGRAN 480*, BASAGRAN</b> bentazon 48%	<b>1,5 – 2 l/ha</b>	V fazi 1 – 5 listov koruze za širokolistne semenske	Ne deluje na slak slabše na ambrozijo  BASARGAN zaloge do 25.8.2020  BASARGAN 480 Datum veljavnosti do 30.6.2019
<b>HERBOCID XI</b> 2,4-D DMA 60%	<b>1,25 l/ha</b>	pri fazi 2 – 4 liste koruze oz. 15-20cm  za širokolistne pleveli, slak osat, <b>za ambrozijo</b> .	lahko v kombinaciji z drugimi herbicidi.
<b>ESTERON</b> 2,4 D 2-EHE 90,5%	<b>1 l/ha</b>	pri fazi 4 – 6 list koruze  za širokolistne pleveli, <b>za ambrozijo</b>	
<b>MUSTANG 306 SE</b> 2,4-D 2-EHE	<b>0,5 – 0,6 l/ha</b>	do 4 – 5 lista koruze, za širokolistne pleveli, slak in osat, <b>za ambrozijo</b>	

45,242% + florasulam 6,25%			
<b>ELUMIS *</b> mezotrión –7,5% + Nikosulfuron – 3%	<b>Do 1,5 l/ha</b>	Po vzniku od 2-8 listov koruze, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela.	
<b>LAUDIS</b> tembotrión 4,4 %	<b>1,15 – 2,25 l/ha</b>	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom  Omejitve pri kolobarju!
<b>LAUDIS WG 30</b> tembotrión 20 %	<b>0,25 – 0,5 kg/ha + močilo</b>	Za širokolistne in nekatere ozkolistne plevele, pri 2 – 8 listu koruze	V komb. s herbicidi proti travnim plevelom  Omejitve pri kolobarju!
<b>LONTREL 100 *</b> Klorpiralid 10%	<b>1 – 1,2 l/ha</b>	za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista	osat, <b>pelinol. ambrozija</b> , kamilice in slak.  Omejitve pri kolobarju !
<b>LONTREL 72SG</b> Klorpiralid 72%	<b>0,17kg/ha</b>	za širokolistne plevele v fazi 2 – 5 lista	osat, pelinol. ambrozija, kamilice in slak.  Omejitve pri kolobarju!
<b>PEAK 75 WG</b> prosulfuron 75%	<b>20 g/ha + močilo</b>	širokolistni pleveli, slak, kislice in osat , <b>za ambrozijo Po vzniku koruze do 7. Lista koruze. Kolobarne omejitve !</b>	
<b>STARANE FORTE</b> Fluroksipir 33,3%	<b>0,54 L/ha</b>	V fazi 2-6 listov koruze  Za širokolistne plevele: plezajoča lakota, breskova dresen, navadna zvezdica, rogovilček, njivski slak.	Njivski slak lahko tretiramo točkovno, ko je koruza 30-100 cm visoka ob obvezni uporabi ščitnika.  Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane površine posušijo.
<b>TANDUS 200 EC</b> fluroksipir 20%	<b>1 l/ha</b>	v fazi 3 – 6 listov, za nekatere širokolistne plevele (kislice,robide)	Tudi slak
<b>BANVEL 480 S *</b> Dikamba -48 %	<b>0,6 l/ha</b>	za širokolistne (enoletne in večletne) pri fazi 2 – 8 list koruze	dobro deluje na slak, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>KALIMBA, DICASH</b>  Dikamba- 48 %	<b>0,6 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela  <b>V fazi od 2. do 8 lista koruze, najboljše od 3 – 5 lista koruze</b>	Ne sme se tretirati pri temperaturah zraka višjih od 28°C, <b>za ambrozijo</b>  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>ARRAT *</b>	<b>0,2</b>	od 2 – 8 listov koruze	Tudi na slak, <b>za ambrozijo.</b>

Dikamba - 50 % Tritosulfuron - 25%	<b>kg/ha</b>	Za širokolistne pleveli  Priporočeno dodajanje močila DASH HC 1L/ha  Datum veljavnosti do 31.11.2019	
<b>ALISEO*</b> Nikosulfuron 30% + rimosulfuron-15%	<b>70 g/ha</b> <b>+ močilo Trend 90</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne pleveli
<b>ALISEO PLUS *</b> Dikamba 60,52%+ Nikosulfuron 9,2% + Rimosulfuron 2,3%	<b>350 – 440 g/ha</b> <b>+</b> <b>Močilo Trend 90 v 0,1%</b>	Od 2. do 6. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne pleveli. V času tretiranja mora biti listje suho, hkrati pa najmanj 3 ure ne sme deževati.  Za ambrozijo (dikamba)
<b>ARIGO</b> Mezotriion 36% + Nikosulfuron 12% + rimosulfuron 3%	<b>330 g/ha</b> <b>+ močilo Trend 90 v 0,1%</b>	Od 2. do 8. lista koruze	Za enol. in večletne ozkolistne ter širokolistne pleveli
<b>HARMONY 50 SX</b> tifensulfuron - metil 50%	<b>22,5 g/ha</b> <b>+ močilo</b>	pri fazi 2 – 8 listov koruze, za zatiranje širokolistnih plevelov	tudi za ščir in metlike.  Datum veljavnosti do 30.6.2019
<b>EQUIP</b> Foramsulfuron-2,25%	<b>2 – 2,5 l/ha</b>  <b>Močilo je že dodano!</b>	za travne in enoletne širokolistne pleveli; v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, osat, d. sirek, pl. Pirnica, <b>za ambrozijo</b> .  Datum veljavnosti do 31.7.2019
<b>MAISTER OD</b> Foramsulfuron-3% jodosulfuron.- metil natrij- 1%	<b>1,5 l/ha</b>	ozkolistni in širokolistni pleveli v fazi 2 – 6 listov koruze	tudi za slak, <b>za ambrozijo</b>  <b>Zaloge v uporabi do 4.7.2019</b>
<b>TAROT 25 WG</b> * rimirisulfuron 25 %	<b>40 – 60 g/ha</b> <b>+ močilo</b>	<b>Od 2. do 8. lista koruze</b>  <b>za travne pleveli</b> in nekatere širokolistne, divji sirek, pirnica, kostreba, muhviči, ščir, abutilon	
<b>MOTIVELL* ali SAMSON 4 SC* ali BANDERA *</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1 l/ha</b>	<b>za travne pleveli</b> tudi divji sirek, pirnica, kostreba in <b>za nekat. enoletne širokolistne pleveli</b> 3 – 8. list koruze	ne deluje na slak ,za ščir, slabše na ambrozijo.V kombinaciji s herbicidi za širokolistne pleveli !  Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>KELVIN* ali KELVIN OD*</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1 l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne pleveli, 3 – 6. list koruze	Datum veljavnosti do 31.12.2019
<b>NICOSH* ali PRIMERO*</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1l/ha</b>	za travne in za nekatere enoletne širokolistne pleveli, 3 – 6. list koruze	

		PRIMERO Datum veljavnosti do 31.12.2019	
<b>SAMSON EXTRA 6 OD* ali MILAGRO EXTRA 6OD* ali MOTIVELL EXTRA 6 OD*</b> <b>Nikosulfuron – 6%</b>	<b>0,75 l/ha</b>	<p><b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b>, za travne pleveli tudi divji sirek, pirlica, kostreba, muhviči</p> <p>in za nekatere enoletne širokolistne pleveli. Ne uporablja se jih v sladki koruzi</p> <p>Datum veljavnosti do 31.12.2019</p>	
<b>ENTAIL* ali MILAGRO 240 SC*</b> <b>Nikosulfuron – 24%</b>	<b>0,17 l/ha</b>	<p><b>Po vzniku od 2-8 listov koruze</b>, selektivnost za korizo je najboljša <b>od 3- 5 lista koruze</b></p> <p>za zatiranje ozkolistnega</p> <p>in širokolistnega plevela</p> <p>Datum veljavnosti do 31.12.2019</p>	
<b>TALISMAN</b> <b>Nikosulfuron – 4%</b>	<b>1,125 l/ha</b>	<p>za travne in za nekatere enoletne širokolistne pleveli, <b>3 – 6. list koruze</b></p> <p>Datum veljavnosti do 31.12.2019</p>	
<b>CLIOPHAR 600 SL</b> Klopiralid 60%	<b>0,16-0,2 l/ha</b>	Za zatiranje širokolistnega plevela V fazi od 2 do 5 listov koruze	Dobro zatira, kamilico,osate,bodiče Zaloge v uporabi do 20.10.2020 Kolobarne omejitve!
<b>MONSOON ACTIVE</b> Foramsulfuron 3% + tienkarbazon-metil 1%	<b>1,5 l/ha ali 0,75 + 0,75 l/ha</b>	Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Mogoča deljena aplikacija <b>Uporaba v fazi od 2-6 list koruze</b>
	<b>2 l/ha ali 1 + 1 l/ha</b>	Divji sirek	Datum veljavnosti do 31.7.2019
<b>OSORNO, TEMSA SC</b> <b>Mezotriion 10%</b>	<b>1,5 l/ha</b>	<p>Uporaba v fazi od 2 do 8 listov na koruzi</p> <p><b>Za zatiranje nav. kostrebe in enoletnega širokolistnega plevela</b>, njivske vijolice, <b>ambrozije</b>, plezajoče lakote in nav. slakovec</p>	
<b>CAPRENO</b> <b>Tembotriion 34,5%</b> + tienkarbazon-metil 6,8%	<b>0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičinega olja</b> <b>Uporaba v fazi 2-6 listov koruz</b>	Zatira dresni, belo metlico, pasje zelišče, kamilico, nav. kostrebo, zeleni muhvič, srhodlak. ščir, nav. slakovec Enoletni ozkolistni in širokolistni plevel	Sredstvom se lahko tretira, ko so rastline suhe. Sredstvo lahko uporabimo samo 1x v rastni dobi. Kolobarne omejitve !
<b>NIKITA</b> <b>Dikamba 31,5%</b> + <b>Mezotriion 15%</b> + <b>nikosulfron 10%</b>	<b>0,45 kg/ha</b>	Po vzniku koruze v fazi, ko ima koruza razvitih od 2 do 9 listov	Enoletni ter večletni širokolistnega in ozkolistni pleveli, <b>za ambozijo</b>
<b>SPANDIS</b> <b>Dikamba 40%</b> + <b>Nikosulfron 10%</b> + <b>prosulfron 4%</b>	<b>0,4 kg/ha</b>	Uporaba, ko sta 2 lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela
<b>CALLAM</b> Dikamba60%+	<b>0,3 kg/ha</b> + DASH	Uporaba v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov koruze	Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in

Tritosulfuron 12.5%	<b>0,8 – 1 l/ha</b>		večletnega širokolistnega Plevela	
<b>FOCUS ULTRA</b>  Cikloksidim 10%	<b>Ozkolistni plevel:</b>  <b>2 L/ha ali 1 L/ha z 1 L/ha močila DASH HC,</b>  <b>Širokolistni plevel</b>  <b>4 L/ha ali 2 L/ha z 2 L/ha močila DASH HC.</b>	Sredstvo se uporablja po vzniku gojenih rastlin do petih pravih listov	Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela	
<b>NAGANO</b>  Bromoksinil 10%+  Mezotriion 10%	<b>0,5 - 1,0 L/ha</b>	S sredstvom se tretira po vzniku posevka koruze, v fenološki fazi od dveh do osem razvitih listov koruze	za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi	

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 31.05.2019 12:23

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

