



60. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC (bolhači) - 10.06.2019 14:02 - Zaključeno



Vremenske razmere omogočajo pojav **bolhačev** na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v prejšnjem tednu, saj so rastline po presajanju najbolj občutljive na poškodbe od bolhačev.

Za zatiranje **bolhačev** so na kapusnicah registrirani naslednji insekticidi:

aktivna snov	pripravek	odmerek	karenca (dni)	Registriran za: opombe
deltametrin	Decis 100 EC	63 ml/ha	7 dni	Zelje, cvetača, brstični ohrovt. Tretira se ob pojavu prvih škodljivcev S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se je treba tretiranju pri visokih temperaturah zraka.
lambda cihalotrin	Karate Zeon 5 CS	0,15-0,2 L/ ha	21 dni	Brstični ohrovt, zelje za listne uši in druge grizoče ter sesajoče žuželke
alfa-cipermetrin	Fastac 100 EC	0,075 L/ha	14 dni	Na kapusnicah (zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju, ohrovtu): S sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Tretira se, ko je presežen prag škode, pri čemer je potrebno upoštevati karenco. Ne priporoča se tretiranja nad 25°C.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

