



57. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 12.06.2019 19:02 - Zaključeno



Pridelovalcem poznih sort češenj (začetek barvanja plodov; 81 po lestvici BBCH) priporočamo nameščanje **rumenih lepljivih plošč** za spremljanje **češnjeve muhe**. Ko zasledite nalet (1 muha / 2 vabi), so za varstvo pridelka predvideni: **IMIDAN 50 WG** (1,5 kg/ha; 14 dni karence), **MOSPILAN 20 SG** (0,375 kg/ha; 14 dni karence) ali **NATURALIS** (2 l/ha; brez karence; predvidenih tri do pet tretiranj na 5 do 7 dni). Učinkovitost insekticida se poveča z dodatkom prehranske vabe **Nutrel** (1,5 %).

Na vrtovih uporaba insekticidov ne pride v poštev. Tam svetujemo obešanje rumenih lepljivih plošč na sončno stran krošnje (do 10 na drevo). Po obiranju boste rumene lepljive plošče odstranili.

Visoke temperature in suho vreme preprečujejo razvoj sadnih gnilob. Preventivno lahko za zaščito pred njimi poskrbite z **AMYLO – X** (1,5 – 2,5 kg/ha) ali **SERENADE ASO** (8 l/ha), ki sta oba sprejemljiva v ekološki pridelavi.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.06.2019 19:02

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

