



59. VARSTVO VINSKE TRTE - 19.06.2019 14:48 - Zaključeno



Vinska trta zaključuje s cvetenjem (69 – 71 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom svetujemo, da za omejevanje aktivnih okužb s **peronosporo vinske trte** uporabite kombinirane pripravke kot so: **REBOOT** (0,4 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FOLPAN GOLD** (staro ime RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE; 2,5 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha) ali **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Sistemsko delujoča priprava na osnovi fosfonatov: **SORIAL LX** in **LBG-01F34** nanesete v odmerku 4 l/ha, če ju uporabite samostojno, oz. 3 l/ha v kombinaciji s fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb. **DELAN PRO** (3 l/ha) kot kombinacija fosfonatov in ditianona deluje podobno. S sredstvi na osnovi aktivne snovi fosetil aluminij je potrebno nanos opraviti 3 × zaporedoma, v razmiku 8-10 dni (prilagodite intenzivnosti rasti). Uporabite lahko: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha) ali **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha) ali **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), oz. preventivno: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (1-2 kg/ha).

Nevarnost okužb z **oidijem vinske trte** ostaja. Izpostavljeni so kabrniki, katere je potrebno zaščititi s pripravkom: **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **SPIROX D** (0,5 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha) ali **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha),...

Upoštevajte, da visoke temperature ovirajo nanos in učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev. V kombinaciji s spodbujevalci rasti in listnimi gnojili **lahko pride do pojavov fitotoksičnosti**. Zaščito vinogradov opravite v večernem času, ko so temperature nižje in se izognete zanašanju. Razmike med tretiranjimi prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

Pri pregledih vinogradov redno sledimo razvoju **ameriškega škržatka**. O primerni izvedbi varstva pred prenašalcem **zlate trsne rumenice** vas bomo po popolnem zaključku cvetenja vinske trte pravočasno obvestili.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.06.2019 14:48

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

