

72. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 26.06.2019 13:23 - Zaključeno



Vroče in razmeroma suho vreme je manj ugodno za okužbe s peronosporo vinske trte, medtem ko verjetnost za pojav **oidija** večja, zato je potrebno nameniti varstvu pred to boleznijo dodatno pozornost. Gliva namreč v fazi debelitve jagod le te okužuje tudi pri nižji relativni zračni vlagi.

Osnovni preventivni ukrep za preprečevanje okužb je dosledno opravljena pletev in odstranjevanje zalistnikov v območju grozdičev, da ohranjamo listno steno čim bolj zračno. Za varstvo pred omenjeno boleznijo svetujemo rabo učinkovitih pripravkov z dolgotrajnejšim delovanjem kot so **Baltazar, Collis SC, Crystal, Custodia, Domark, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350 EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M** ali **Vivando**, ki jih uporabite v kombinaciji s pripravkom na osnovi **močljivega žvepla**.

Nevarnost za nove okužbe s **peronosporo** se lahko ob pojavu morebitnih lokalnih padavin in obilnejših jutranjih ros hitro poveča, zato še vedno priporočamo uporabo **pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polysistemskim delovanjem**, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Pri izbiri pripravkov upoštevajte načela antirezistenčne strategije in izmenično uporabljajte pripravke na podlagi aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Izjema so pripravki na podlagi fosepil-Al, ki jih je za doseganje večje učinkovitosti priporočljivo uporabiti dva do trikrat zaporedoma.

V vročih dneh opravite škropljenje v jutranjem ali večernem času, ko je zaradi nižjih temperatur zraka nanos škropilne brozge boljši in manjša možnost pojava fitotoksičnosti zaradi uporabe nekaterih pripravkov, predvsem na osnovi žvepla. Škropljenje izvajajte v ustreznih časovnih razmikih (8-12 dni), ki jih prilagodite intenzivnosti prirasta mladik in morebitnemu pojavu simptomov bolezni v vinogradu.

V primeru pojava neurji s točo svetujemo čimprejšnjo uporabo kontaktnih pripravkov kot so: **Folpan 50 SC / 80 WDG** ali **Follow 80 WG** ali drugih kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 26.06.2019 13:23

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

