

63. OREHOVA MUHA - 19.07.2019 10:37 - Zaključeno



Spremljanje pojava in zatiranje orehove muhe

Na območju Celjske in Koroške regije smo 15. julija na vseh opazovanih lokacijah na višini postavljenih plošč 5 – 6 m zabeležili prve muhe. Ob kontroli 18. julija smo prve muhe zabeležili tudi na višini 2 m. Ob porastu temperatur v prihodnjih dneh pričakujemo številnejše ulove. Zato svetujemo, da v svojih nasadih natančno (na tri dni) spremljate ulove orehove muhe z vabami in prvo škropljenje opravite do 5 dni po prvem ulovu na vabo.

Prvo škropljenje svetujemo opraviti s pripravkom na osnovi aktivne snovi spinosad **Laser 240 SC** v odmerku 0,15 L/ha ali **Laser plus** v odmerku 0,075 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant **Nutrel** v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode), ki privablja odrasle orehove muhe, te se z njim hranijo in s tem zaužijejo tudi insekticid.

S to mešanico se **poškropi spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani** tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge. Za škropljenje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da boste po škropljenju še beležili ulove orehove muhe, škropljenje enkrat ali dvakrat ponovite v presledku enega do dveh tednov. Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Pripravek Laser 240 SC ali Laser plus se lahko na istem zemljišču uporabi največ 3 krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenih pripravkov se lahko škropljenje opravi tudi s pripravkoma **Calypso 480 SC** v odmerku 0,25 L/ha ali **Imidan 50 WG** v odmerku 1,5 kg/ha in dodatkom atraktanta **Nutrel**, pri čemer se ravno tako poškropi samo spodnja tretjina drevesa na S ali V strani. Pripravka se lahko uporabi na istem zemljišču največ 2 krat v eni rastni sezoni.

Omenjena priprava priporočamo uporabiti v primeru, da se bo let orehove muhe nadaljeval še v drugi polovici meseca avgusta, oziroma po potrebi za četrto škropljenje, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Pri delu upoštevajte **karenco**, ki je za pripravek Laser 240 SC in Laser plus 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V **ekoloških nasadih** je dovoljena samo kombinacija pripravka **Laser plus** ali **Laser 240 SC + Nutrel**.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

Datum objave obvestila: 19.07.2019 10:37

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Priprava: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

