



## 79. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.16 - 31.07.2019 08:51 - Zaključeno



Najbolj zgodnje sorte jablan so na večini spremljanih lokacij dosegle fenološko fazo: plodovi veliki 80% končne velikosti (BBCH -78).

Zaradi pogostih padavin prihaja do spiranja škroplilne obloge, zato je le-to potrebno obnoviti.

Za preprečevanja okužb s **pozni škrlupom in skladiščnimi boleznimi** za zaključna škropljenja najbolj zgodnjih klonov sorte 'gala' in 'elstar' priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: **Amylo – X** (1,5-2,5 kg/ha) ali **Bellis** (0,8 kg/ha; karenc 7 dni) ali **Flint** (0,1-0,15 kg/ha; karenc 21 dni) ali **Geoxe** (0,45 kg/ha; karenc 3 dni) ali **Luna experience** (0,75 L/ha; karenc 14 dni) ali **Merpan 80 WDG** (1,88 kg/ha; karenc 28 dni) ali **Orthocide 80 WG** (2,0 kg/ha; karenc 28 dni) ali **Pomax** (1,6 L/ha; karenc 5 dni) ali **Scab 480 SC** (3,13 L/ha; karenc 21 dni) ali **Scab 80 WG** v 1,9 kg/ha (karenc 21 dni) ali **Switch 62,5 WG** (1 kg; karenc 3 dni) ali **Vitisan** (2,5 kg/ha; karenc 1 dan) ali **Zato 50 WG** (0,1-0,15 kg/ha; karenc 21 dni) ali **Zato plus** (1,9 kg/ha; karenc 35 dni). **Upoštevajte karencne dobe !!!**

V nasadih pozni sort ('fuji', 'idared'...) je mogoče uporabiti enega od naslednjih fungicidov: **Merpan 80 WDG** v 1,88 kg/ha (karenc 28 dni), **Orthocide 80 WG** v 2,0 kg/ha (karenc 28 dni), **Scab 480 SC** v 3,13 L/ha (karenc 21 dni), **Scab 80 WG** v 1,9 kg/ha (karenc 21 dni), **Zato plus** v 1,9 kg/ha (karenc 35 dni) ali **Zato 50 WG** ali **Flint** v odmerku 0,1 - 0,15 kg/ha (karenc 21 dni).

Za zatiranje jabolčnega zavijača v tem obdobju priporočamo uporabo enega izmed naslednjih insekticidov: **Affirm** v max. 4,0 kg/ha (karenc 7 dni) ali **Delegate 250 WG** v 0,3 kg/ha, (karenc 7 dni; **samo enkrat v rastni dobi !!!**) ali **Laser plus v 0,3 L/ha** (karenc 7 dni; **samo enkrat v rastni dobi !!!**)

V primeru neurij s točo priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: **Merpan 80 WDG**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG** ali **Scab 480 SC**.

Opozorjamo na redno spremljanje pojava **hrušvega ožiga**. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

**Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karencnih dob, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.**

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 31.07.2019 08:51

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

