

110. OBVESTILO O VARSTVU HRUŠK IN JABLAN - 02.08.2019 13:14 - Zaključeno



Zgodnje sorte hrušk in jablan so v toplejših predelih Primorske že v fenološki fazi BBCH 79 (plodovi dosegli 90 % končne velikosti). V Brkini so jabolka v povprečju dosegla 50 - 60 % končne velikosti, na Tolminskem 60 -70 %.

Škrlup

Za zaključena škropljena proti škrlupu dajemo prednost fungicidom, ki imajo dobro delovanje na skladišeni škrlup in ostale skladišene bolezni. Za ta namen lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan ter nekatere druge pripravke, ki so posebej registrirani za ta namen.

JABLANE	HRUŠKE	Odmerek / konc.	Karenca
Sredstvo			
Merpan 80 WDG	Merpan 80 WDG	1,88 kg/ha	28 dni
Scab 80 WG	Scab 80 WG	1,9 kg/ha	28 dni
Scab 480 SC	Scab 480 SC	3,13 L/ha	21 dni
Orthocide 80 WG	Orthocide 80 WG	2 kg/ha	21 dni
Zato 50 WG	-	0,1- 0,15 kg/ha	21 dni
Zato Plus	•	1,9 kg/ha	35 dni
Flint	-	0,1- 0,15 kg/ha	21 dni
Bellis	Bellis	0,8 kg/ha	7 dni
Geoxe	Geoxe	0,45 kg/ha	3 dni
Switch 62,5 WG	Switch 62,5 WG	1,0 kg/ha	3 dni
Luna experience	Luna experience	0,75 L/ha	14
Pomax	Pomax	1,6 L/ha	5
Vitisan	-	2,5 kg/ha	1

Jabolčni zavijač

V minulem tednu so ulovi jabolčnega zavijača ponovno presegali prag škodljivosti na območju Brkinov na lokaciji Zavrhek ter v Vipavski dolini na lokaciji Dombrova. Škropljenje proti zavijaču svetujemo le za tista območja, kjer je presežen prag škodljivost. V tem obdobju svetujemo uporabo pripravkov: **Affirm** v odmerku **4,0 kg/ha**, **Delegate 250 WG** v odmerku **0,3 kg/ha**, **Laser plus** v odmerku **0,3 L/ha** ali pripravek **Steward** v odmerku **225 g/ha**. Vsi naštetni pripravki imajo 7 dni karence. Uporabite lahko tudi pripravek **Mospilan 20 SG** v odmerku **0,4 kg/ha** ali **Calypso SC 480** v odmerku **0,3 L/ha**, ki delujeta tudi na druge sesajoče žuželke. Zlasti na ličinke marmorirane smrdljivke, ki so na območju Spodnje Vipavske doline in Goriških brd še vedno v velikem številu prisotne v nasadih. **Oba pripravek imata 14 dni karence ter dovoljenje za dvakratno letno rabo.**

Pri uporabi čebelar nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Marmorirana smrdljivka

V nasadih jablan in hrušk na območju Vipavske doline in Goriških Brd opazamo prve odrasle osebkke poletne generacije marmorirane smrdljivke, ki je že začela z odlaganjem jajčec. Poleg tega so v nasadih še vedno prisotne ličinke 2.-5. stopnje prezimne generacije. Škropljenje proti odraslim stenicom je manj učinkovito, ker so zelo mobilne in hitro odletijo s škropljenih površin, zato svetujemo predvsem zatiranje ličink, v kolikor jih opazate v nasadih. V nasadih jablan in hrušk ima dovoljenje za ta namen pravek **Mospilan 20 SG**, v **0,05 % konc.** oziroma v najvišjem odmerku **0,5 kg/ha**, V nasadih hrušk lahko uporabite tudi pripravek **Karate Zeon 5 CS** v **0,018 % konc.**. Oba pripravka imata dovoljenje za dvakratno letno rabo na istih zemljiščih.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev ter upoštevajte omejitve glede maksimalnega števila letnih rab. Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 02.08.2019 13:14

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: ROT Mojca

Pripravila: **Mojca Rot**

[Seznam registriranih FFS](#)

