



71. OREHOVA MUHA - 06.08.2019 10:58 - Zaključeno



V večini nasadih orehov, kjer so opravili prvo škropljenje proti orehovi muhi so ulovi na vabah malo številčni pa se muha sploh ne lovi. Tudi na ostalih opazovanih lokacijah so ulovi trenutno malo številčni. V nasadih, kjer imajo z obvladovanjem škodljivke že več let težave, pa so ulovi po prvi aplikaciji spet začeli naraščati. Zato je v takšnih nasadih potrebno opraviti drugo aplikacijo.

Nadaljujte s spremljanjem ulovov orehove muhe z vabami in ob naraščanju le teh opravite škropljenje

s pripravkom na osnovi aktivne snovi spinosad **Laser 240 SC** v odmerku 0,15 L/ha ali **Laser plus** v odmerku 0,075 L/ha in porabi vode 3L na odraslo drevo oz. 380 L/ha. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant **Nutrel** v 1,5 % koncentraciji (1,5 L/100 L/vode), ki privablja odrasle orehove muhe, te se z njim hranijo in s tem zaužijejo tudi insekticid.

S to mešanico se **poškropi spodnjo eno tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani** tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge. Za škropljenje se uporabi šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

V primeru, da boste po škropljenju še beležili ulove orehove muhe, škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Pripravek Laser 240 SC ali Laser plus se lahko na istem zemljišču uporabi največ 3 krat v eni rastni sezoni.

Namesto zgoraj omenjenih pripravkov se lahko škropljenje opravi tudi s pripravkoma **Calypso 480 SC** v odmerku 0,25 L/ha ali **Imidan 50 WG** v odmerku 1,5 kg/ha in dodatkom atraktanta **Nutrel**, pri čemer se ravno tako poškropi samo spodnja tretjina drevesa na S ali V strani. Pripravka se lahko uporabita na istem zemljišču največ 2 krat v eni rastni sezoni.

Pri delu upoštevajte **karenco**, ki je za pripravek Laser 240 SC in Laser plus 30 dni, za pripravek Calypso 14 dni, za Imidan 50 WG pa 7 dni.

V **ekoloških nasadih** je dovoljena samo kombinacija pripravka **Laser plus** ali **Laser 240 SC + Nutrel**.

Pred uporabo FFS preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Upoštevajte predpisane razdalje od voda I. in II. reda. Pri uporabi sredstev nevarnih za čebele izvajajte škropljenje izključno pozno zvečer, ponoči ali zgodaj zjutraj, ko so čebele v panjih ter poskrbite, da bo podrast pomulčena!

Datum objave obvestila: 06.08.2019 10:58

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

