



85. OBVESTILO O ZATIRANJU OREHOVE MUHE - 30.08.2019 08:48 - Zaključeno



Pridelovalce orehov obveščamo, da so se ulovi orehove muhe na rumene lepljive plošče v drugi polovici meseca avgusta še vedno konstantni, saj se na ulovi povprečno vsaj 1 do 2 mehi na dan. Zato še vedno priporočamo, da vsaj enkrat na teden redno kontrolirate rumene plošče. Prav tako priporočamo, da kontrolirate količino atraktanta v vrečki. V nasadih, kjer je od zadnjega zatiranja orehove muhe minilo 14 dni in se na rumene lepljive plošče lovi orehova muha, priporočamo ponovno škropljenje.

Za zatiranje je mogoče uporabiti **Laser 240 SC** v odmerku 0,15 l/ha (karenca: 30 dni) ali **Laser plus** v odmerku 0,075 L/ha (karenca: 30 dni) pri porabi vode **do** 3 L na odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. **NutreI** (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). **Tretira se le tretjino drevesne krošnje** (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje naj se uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice. Pripravek Laser 240SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

Namesto pripravka Laser je mogoče uporabiti tudi pripravek **Calypso SC 480** (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni, karenca; karenca;14 dni) ali **Imidan 50 WG** (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni; karenca 7 dni). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. **NutreI**. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

Pri izbiri priporočenih pripravkov upoštevajte čas zorenja posameznih sort in dolžino karenčne dobe posameznih pripravkov.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 30.08.2019 08:48

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

