

Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Oljna ogrščica  
/ 88. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI

## 88. VARSTVO OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI - 22.10.2019 08:04 - Zaključeno



Zaradi višjih temperatur zraka v SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, prisotne pa so tudi že okužbe s **suho trohnobo stbla ogrščice** (suha trohnoba zelja *Leptosphaeria maculans* = *Phoma lingam*). Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in se odločite za uporaba fungicidov.

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: **Folicur EW 250** 0,5 l/ha ali **Star tebukonazol** 0,5 l/ha ali **Orius 25 EW** 1 l/ha ali **Caramba** 1,2 l/ha ali **Mirador forte** 1,5-2 l/ha ali **Baltazar** 0,5 l/ha ali **Score 250** 0,5 l/ha. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

Ogrščica najboljšje prezimi v fazi 7-8 listov. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in zmanjšanja pridelka. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimitev.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 22.10.2019 08:04

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

[Seznam registriranih FFS](#)

