



Zahodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica / Koščičarji
/ 1. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN

1. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC, BRESKEV IN NEKTARIN - 05.02.2020 14:07 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmata carpophila*)

Na sončnih legah so brsti zgodnjih sort marelic že močno napeti. Pridelovalcem svetujemo, da sorte, ki so v fenološki fazi B-C po Baggoliniju ali 51-53 po BBCH lestvici škropite proti **listni luknjičavosti koščičarjev** in drugim boleznim, ki prezimijo na lesu. Za škropljenje nasadov uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprblau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprblau Z 35 WP	2 kg/ha

Škropimo, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 % Škropljenje opravite takrat, ko nočne temperature niso pod lediščem. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmata carpophila*)

Na južnih legah so brsti zgodnjih sort breskev in nektarin močno napeti. Pridelovalcem priporočamo, da omenjene nasade škropite proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**. Za škropljenje uporabite **bakrove pripravke**. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprblau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprblau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprblau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 % Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 05.02.2020 14:07

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

