



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Koščičarji
/ 7. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV, NEKTARIN in MARELIC št. 2

7. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV, NEKTARIN in MARELIC št. 2 - 21.02.2020 13:05 - Zaključeno



Vremenske razmere so z nadpovprečno visokimi dnevnimi temperaturami v zadnjih dneh pospešile razvoj breskev in nektarin. Tako so brsti breskev in nektarin že napeti (BBCH 01-03, konec nabrekanja brsta: luske razprte, vidni svetlo zeleni deli brsta) in to predvsem na drevesih, ki rastejo na lažjih – peščenih tleh v mestu in na najbolj ugodnih - toplih legah.

V fenološki fazi brstenja je nevarnost okužbe breskev in nektarin z **breskovo kodravostjo** velika, še posebej, če po toplem obdobju nastopi deževno vreme. **Breskova kodravost** je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev in pojav te bolezni ni mogoče napovedati, zato škropimo drevesa breskev in nektarin **preventivno**.

Pričakujemo da bodo prve okužbe z breskovo kodravostjo možne ob prvih napovedanih padavinah, še posebej če bodo temperature zraka v času padavin nad 8 °C, zato je potrebno breskve in nektarine poškopiti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V primeru ohladitve vremena in padca nočnih temperatur pod 0 °C se škropljenje opravi šele po ponovni otoplitvi (nočne temperature nad 0 °C) zaradi preprečitve morebitnih ožigov.

Za prvo škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi bakra:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha (le listna luknjičavost)
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2,0 kg/ha (le listna luknjičavost) 3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	1,8 kg/ha
Cuprablau Z ultra WP	2,0 kg/ha (le breskova kodravost)
Nordox 75 WG	

Drevesa **marelic**, ki rastejo na zavetnih legah imajo prav tako že nabrekle brste. Za zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev na marelicah** priporočamo uporabo bakrovega pripravka:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2-3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Drevesa naj bodo temeljito poškopljena.

PRED UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO !!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 21.02.2020 13:05

Obvestilo prognozičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024