



11. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN št. 3 - 06.03.2020 08:38 - Zaključeno



V nasadih **breskev in nektarin** nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti breskovi kodravosti v tem času uporabite pripravke **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha) ali **Syllit 544 SC** (1,65 L/ha). Škropljenje je potrebno opraviti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V fenološki fazi začetka cvetenja breskev in nektarin, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi. Uporabite lahko pripravke: Amylo-X ali Chorus 50 WG ali Luna experience ali Mavita 250 EC ali Prolectus ali Score 250 EC ali Signum ali Switch 62,5 WG ali Zanby ali Teldor SC500 (samo breskev) ali Topsin – M (samo breskev) v dovoljenih odmerkih.

Našeta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v večernem času.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 06.03.2020 08:38

Obvestilo prognošičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MATKO Boštjan

Pripravil: **Boštjan Matko**

[Seznam registriranih FFS](#)

