

13. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 06.03.2020 14:17 - Zaključeno



Breskova kodravost (*Taphrina deformans*)

Nasadi breskev in nektarin so v fenofazi C - D po Baggjoliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (črašni listi odprti). Za zatiranje **breskove kodravosti** lahko uporabite pripravka **Syllit 400 SC** v odmerku 2,25 l/ha ali **Syllit 544 SC** v odmerku 1,65 l/ha.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

V Slovenski Istri zgodnje sorte breskev in nektarin prehajajo v fazo cvetenja (E po Baggjoliniju ali 60 po BBCH lestvici). Ko bo odprtih približno 10 % cvetov je priporočljivo škropiti proti **cvetni moniliji**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Anylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 06.03.2020 14:17

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

