

23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.5 - 27.03.2020 12:21 - Zaključeno



Razvoj sadnega drevja je v zadnjem tednu zaradi nizkih temperatur počasneje napredoval. Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...) in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo zeleni popek - rožnati popek (BBCH 56-57).

Kljub padavinam v času med 25. in 27. marcem na lovilcu spor mycotrap askospor jablanovega škrlupa nismo zaznali. Čeprav je na nekaterih opazovanih lokacijah listje bilo mokro 48 ur in več, kar ob trenutnih temperaturah zadošča za blago primarno okužbo z **jablanovim škrlupom**, le-ta zaradi odsotnosti askospor ni bila mogoča.

Ob naslednjih napovedanih padavinah lahko pričakujemo, da bodo v primeru višjih temperatur izbruhi askospor mogoči in s tem tudi nove okužbe, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu in hruševemu škrlupu** priporočamo predvsem uporabo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi dodin (**Syllit 400 SC, Syllit 544 SC**). Lahko uporabite tudi enega od ostalih kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45**) ali a.s. metiram (**Polyram DF**) ali pripravka na osnovi a.s. ditianon (**Delan PRO**).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 27.03.2020 12:21

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

