



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Koščičarji / 24. Varstvo sliv in češpelj

24. Varstvo sliv in češpelj - 30.03.2020 10:31 - Zaključeno

Slive in češplje so v fenološki fazi od socvetja v balonskem stadiju (BBCH 59) pa do polnega cvetenja (BBCH 65). Za zatiranje **cvetne monilije** v fazi cvetenja (prvič, ko je odprtih vsaj 10% cvetov in drugič, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi) priporočamo enega od naslednjih pripravkov: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha; samo na slivi) ali **Luna experience** (samo na slivi; 0,2 L/ha na m višine krošnje oz. maks. 0,6 L/ha) ali **Signum** (samo na slivi v 0,25 kg/ha na m višine krošnje, maks. 0,75 kg/ha) ali **Switch 62,5 WG** (v konc. 0,08% oz. maks. 1,0 kg/ha; samo na slivi) ali **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1m višine krošnje oz. maks. 1,5 L/ha) ali **Topsin M** (samo na slivi; 1 kg/ha) ali **Serenade ASO** (samo na slivi, 8 L/ha) ali **Amylo-x** (od 1,5 do 2,5 kg na ha) ali **Prolectus** (samo slive; 330 g na višinski meter krošnje na ha, maks. 1 kg/ha) ali **Score 250 EC** (0,22 L/ha) ali **Zenby** v odmerku 0,9 l/ha.

Za spremljanje populacije **rumene ali črne češpljeve grizlice** priporočamo, da se izobesijo bele lepljive plošče. Samo v primeru, če se je na bele lepljive plošče ulovilo skupno več kot 30 osic, lahko takoj **po končanem cvetenju (ko odpade večino venčnih listov)** uporabite pripravek **Mospilan 20 SG**.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 30.03.2020 10:31

Obvestilo prognošičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**[Seznam registriranih FFS](#)