



29. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 03.04.2020 10:34 - Zaključeno



Razvoj jablan in hrušk v zadnjem tednu na najbolj ugodnih legah dosegel že fenološko fazo: rožnati popek – odprti prvi cvetovi (E-F po Fleckingerju oz. 57 - 60 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Število izbruhanih askospor je bilo zelo majhno. Pričakujemo, da bodo v času naslednjih obilnejših padavin izbruhi askospor občutno močnejši. V primeru vremenske napovedi s padavinami je zato potrebno jabolane in hruške poskropiti **še pred napovedanim dežjem**.

Za škropljenje proti jablanovemu in hruševemu škrlupu priporočamo predvsem uporabo enega od pripravkov na osnovi aktivne snovi dodin (Syllit 400 SC, Syllit 544 SC). Lahko uporabite tudi enega od ostalih kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45) ali a.s. metiram (Polyram DF) ali priprava na osnovi a.s. ditianon (Delan PRO).

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je mogoče je uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Chorus 50 WG, Faban, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala, Batalion 450 SC**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi. V nasadih, kjer so jabolane že začele cveteti, ne smemo uporabiti pripravkov Syllit 400 SC in Syllit 544 SC. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkom Faban in Syllit.

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold'...), priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 5 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC** oz. **Symbiotica Fito – tekoče žveplo** v odmerku 6 do 7,5 L/ha. V nasadih, kjer so jabolane že začele cveteti, je najvišji dovoljen odmerek za žvepla 3 kg/ha oz. 3 L/ha.

Izleganja **rdeča sadne pršice** se zaradi nizkih temperatur še ni pričelo. Sadjarji, ki niste uporabili mineralnega olja, lahko sedaj uporabite pripravke **Apollo 50 SC** v 0,4 L/ha, vendar **najkasneje do fenološke faze rožnatih popkov (BBCH 57)**. O optimalnem času uporabe pripravkov **Zoom 11 SC, Nissorun 10 WP** ali **Kanemite SC** vas bomo pravočasno obvestili.

Razvoj jablan zaradi toplega vremena zelo hitro napreduje. V fenološki fazi F ali BBCH 60 (začetek cvetenja) je še zadnji čas, da se izobesijo bele lepljive plošče za spremljanje osic **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic. Po cvetenju jablan je potrebno bele lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni organizmi (polonice in tančicarice).

V fenološki fazi rdečega balona se prične izleganje jablanove mokaste uši. Priporočamo, da se nasadi pregledajo. V primeru, da je prag škodljivosti 1 – 2 kolonije na 100 pregledanih cvetnih šopov presežen, je mogoče uporabiti Teppeki v kg/ha ali Neem azal 2,5 L/m višine krošnje

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 03.04.2020 10:34

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

