



17. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 08.04.2020 08:12 - Zaključeno



V suhem in čedalje toplejšem vremenu jabolana cveti (cv. 'Jonagold', 'Gala', 'Elstar', 'Zlati delišes' so na stopnji 60-62 po lestvici BBCH, med tem, ko so cv. 'Idared', 'Carjevič' in 'Topaz' v polnem cvetenju; 65 po lestvici BBCH). Hruške večinoma zaključujejo s cvetenjem (65 – 70 po lestvici BBCH).

Možnosti za glivične okužbe so v suhem vremenu majhne. To velja tudi za **jablanov škrlup**, katerega izbruhi zimskih spor so v aktualnem obdobju šibki. Večja nevarnosti okužb bo sledila z naslednjimi intenzivnimi padavinami. Priporočamo, da opravite zaščito še pred tem. Uporabite lahko: **AVTAR 75 NT** (2 kg/ha), **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **MANFIL PLUS 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha). Kjer še ne cveti, prideta v poštev tudi **SYLLIT 400 SC** (1,9 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira) ali **SYLLIT 544 SC** (1,4 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira).

Za preprečevanje **jablanove pepelovke** je možno dodati tudi pripravke na osnovi žvepla kot so: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **THIOVIT JET** ali **VINDEX 80 WG**, ki jih med cvetenjem odmerjate zmerno, 3 kg/ha; oz. tekoče oblike **BIOTIP SULFO 800 SC**, **POL-SULPHUR 800 SC** ali **SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, zadržano s 3 l/ha.

Za preprečevanje poškodb **jabolčnega zavijača**, je potrebno pri metodi zbežanja namestiti feromonske razpršilce v nasadu še pred pojavom odraslih osebkov. Ta čas običajno sovпада s cvetenjem jabolane. Izberete lahko med: **ISOMATE C TT**, **RAK 3**, **EXOSEX CP** ali **SemiosNET-Codling Moth**.

Uporaba drugih insekticidnih pripravkov v času cvetenja ni predvidena; sredstev, ki so čebelam in drugim opraševalcem nevarna, pa v tem času ni dovoljeno uporabljati.

Za spremljanje naleta osic **jabolčne grizlice** je potrebno v nasade obesiti **bele lepljive plošče**. Prag škodljivosti bo presežen, ko se ulovi 30 ali več grizlic. Lepljive plošče bo potrebno ob zaključenem cvetenju odstraniti, saj se lahko nanje ulovijo tudi koristni organizmi.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 08.04.2020 08:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

