

24. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 14.04.2020 19:01 - Zaključeno



Uporaba žeplovih pripravkov v času brstenja vinske trte vpliva na zmanjšanje populacije trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke kot so **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ki delujejo tudi proti oidiju ter črni pegavosti. V času začetne rasti mladice in razvoja prvih lističev mlade poganjke okužuje gliva povzročiteljica črne pegavosti vinske trte. Okužbe so pogostejše v deževnem vremenu, predvsem na občutljivih sortah kot so na primer Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec. Preprečevanju okužb je potrebno več pozornosti nameniti zlasti v vinogradih, kjer se je bolezen v preteklih letih že pojavila. Za varstvo pred črno pegavostjo lahko uporabite katerega od registriranih kontaktnih fungicidov kot so **Follow 80 WG**, **Folpan 80 WDG**, **Polyram DF** ali bakrov pripravek **Cuprablau Z 35 WG oz. WP**. Uporabite lahko tudi pripravek **Universalis**, ki hkrati deluje tudi proti oidiju. Škropljenje z omenjenimi pripravki opravite pred napovedanimi padavinami in sicer dvakrat v obdobju 7-10 dni, pri čemer prvič škropite, ko so poganjki dolgi 1-2 cm.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 14.04.2020 19:01

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

