



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Vinska trta / 22. VARSTVO VINSKE TRTE

22. VARSTVO VINSKE TRTE - 15.04.2020 21:02 - Zaključeno



Vinska trta brsti. Odpiranje brstov in poganjanje mladik poteka od opaznih konic zelenih poganjkov, do dolžine mladik 5 cm (07-12 po lestvici BBCH).

V dneh, ko temperature ponovno naraščajo, je smiselno preventivno nanesti žveplove pripravke (nad temperaturami 15° C): **THIOMT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **PEPELIN WG**, **VINDEX 80 WG**, ki zaviralno delujejo na pršice (*akarinozo* in *erinozo*) in zmanjšujejo okužbe **črne pegavosti vinske trte** in **oidija vinske**

trte.

V deževnih dneh je nevarnost razvoja **črne pegavosti vinske trte** večja in je še pred padavinami potrebno ukrepati s **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (3 kg/ha), ali bakrovimi CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha) ali CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha). Predvidena sta dva nanosa; prvič, ko so mladike velike ~ 2 cm in drugič 7 do 10 dni kasneje.

Na legah, kjer se je v preteklih letih okrepila populacija **trsne listne pršice šiškarice (erinoze)**, je smiselno uporabiti **VERTIMEC PRO** (1 l/ha; oz. 100 ml / 100 l vode).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 15.04.2020 21:02

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

