

41. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 17.04.2020 13:27 - Zaključeno



Sorte jabolani, ki so v razvoju hitreje ('Idared', 'Jonagold', ...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: polno cvetenje najmanj 50% cvetov odprtih (F po Fleckingerju oz. 65 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili majhen izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Zaradi nagle ohladtve med dežjem, primarna okužba ni bila mogoča.

Za napovedi kratkotrajnih neviht, za naslednje škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT**, **Dithane Dg neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Manfil plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Pinozeb M 45** – vsi 2 kg/ha ali **Penncozeb 75 DG** – 2,0-2,5 kg/ha), a.s. metiram (**Polyram DF** – 2 kg/ha) ali pripravka na osnovi ditianona (**Delan pro** – 2,5 L/ha).

Mogoče je uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Batalion 450 SC** 0,7-1,0 L/ha, **Chorus 50 WG** - 0,45 kg/ha, **Faban** – 1,2 L/ha, **Mythos** – 1,5 L/ha, **Pyrus 400 SC** – 1L/ha, **Scala** - 1,125 L/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ali **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha), v primeru, da škropljenje nebo opravljeno pred padavinami in če bodo izpolnjeni pogoji za okužbo. Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

V nekaterih nasadih opazamo močan pojav **jablanove pepelovke** (še posebej na sortah 'Idared', 'Jonagold'...). V teh nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna priporočamo uporabo sledečih fungicidov: **Luna experience** (0,25 L/m višine krošnje, maks. 0,75 L/ha), **Sercadis** (0,25 L/ha), **Sercadis plus** (0,72 L/ha, (Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup)), **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Zato WG**, **Flint** (0,15 kg/ha) ali **Tercel** (2,5 kg/ha).

V ostalih manj okuženih nasadih z jablanovo pepelovka priporočamo dodajane enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol-Sulphur 800 SC** oz. **Symbiotica Fito** – tekoče žveplo v odmerku 3 kg oz. L/ha.

Izleganje **rdeče sadne pršice** se je zaradi visokih temperatur v tem tednu močno pospešilo. Trenutno rdečo sadno pršico na jablani najdemo v stadiju ličink (ličinke in protonimfe). V primeru, da boste pri pregledu listov našli 3-4 ličinke ali več na spodnjih najmanjših listih, priporočamo od naslednjem škropljenju uporabo pripravkov **Zoom 11 SC** (0,05%), katerega uporaba je dovoljena največ enkrat v eni rastni sezoni ali **Nissorun 10 WP** v odmerku 0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha ali **Kanemite SC** v odmerku 0,625 L/meter višine krošnje (največ 1 škropljenje na sezono). Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

Ulov jabolčne grizlice je na kontroliranih lokacijah zelo majhen in neenakomeren, zato priporočamo, da nadaljujete s spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah.

Metuljčki sadnega listnega duplinarja so pričeli v nasadih v SV Sloveniji z odlaganjem jajčec. Jajčeca najdete na spodnjih listih. Potrebno je pregledovati liste, ki izraščajo iz brstičev in brstik. V primeru preseženega praga škodljivosti (1 jajčece na list) je mogoče v tem obdobju uporabiti Neemazal –T/S v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje in porabi 300 do 500 L vode na ha na meter višine krošnje.

Po modelu **Maryblyt** pogoji za okužbe s **hruševim ožigom** - cvetne okužbe ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih šestih dneh ne bodo izpolnjeni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 17.04.2020 13:27

Obvestilo prognozičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024