

29. OBVESTILO O VARSTVU OZIMNIH ŽIT - 28.04.2020 11:44 - Zaključeno



Srednje pozne in pozne sorte ozimnih ječmenov so sedaj pretežno v obdobju kolenčenja, zgodnejše sorte pa začenjajo s klasenjem. V obdobju nabrekanja listne nožnice do faze, ko so vidne prve konice res oz. do začetka klasenja (BBCH 41-51), je najboljši čas za zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti. Omenjena bolezen se pojavi šele po klasenju, vendar je takrat za zatiranje že prepozno, zato jo zatiramo preventivno. Za škropljenje lahko uporabite katerega od fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Elatus era**, **Elatus plus**, **Priaxor EC**, **Seguris xtra**, **Siltra xpro**, **Zantara** in podobni.

V posevkih spremljajte tudi **rdečega listnega strgača**. Za sedaj opažamo hrošče in manjše poškodbe na listih ter odložena jajčeca.

Datum objave obvestila: 28.04.2020 11:44

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta in MAROLT Neja

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

