



34. OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV - 28.04.2020 16:02 - Zaključeno



Hruške so na vseh območjih že odcvetele, posamezne sorte jablan na hladnejših območjih še cvetijo. Modeli za spremljanje jablanovega škrlupa kažejo, da so bili pogoji za okužbo izpolnjeni le enkrat v tem mesecu in še to le v severovzhodnem delu države. Vseeno pa lahko ob naslednjih obilnejših in dalj časa trajajočih padavinah pričakujemo močne izbruhe askospor škrlupa. Za varstvo nasadov priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so **Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan PRO, Dithane DG Neotec,**

Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram D Sedaj, ko so jablane že odcvetele lahko ponovno za varstvo uporabite tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga** in pripravek **Vitisan**, oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega izmed sistemično delujočih pripravkov kot so **Syllit 400 SC, Syllit 544 SC, Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala** ali **Batalion 450 SC, Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC** ali **Duaxo koncentrat**.

Vremenske razmere z malo padavinami in visoko zračno vlago so ugodne za širjenje jablanove pepelovke, zato za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov kot so **Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC** ali **Symbiotica Fito – tekoče žveplo**. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so **Luna experience, Strobry WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis** ali **Sercadis plus**.

V obdobju **po cvetenju** je v nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je **Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG** ali **Neemazal – T/S**. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.

Našteti pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Datum objave obvestila: 28.04.2020 16:02

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

