



47. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 30.04.2020 15:33 - Zaključeno



Sorte jablan, ki so v razvoju hitreje ('Idared', 'Jonagold', ...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: plodiči večji od 10 mm konec cvetenja (71 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinah med 20 in 30. marcem so v SV Sloveniji na večini sadjarskih lokacij izpolnjeni pogoji za srednjo primarno okužbo (29.4. 2020) v z **jablanovim škrlupom**, na nekaterih (Gačnik, Selo) pa še lahka (27.4). Zaradi napovedi padavin in intenzivne rasti, priporočamo, da nadaljujete s uporabo preventivnih fungicidov, ki so bili navedeni v prejšnjih obvestilih: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT**, **Dithane Dg neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Manfil plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Pinozeb M 45** – vsi 2 kg/ha ali **Penncozeb 75 DG** – 2,0-2,5 kg/ha), a.s. metiram (**Polyram DF** – 2 kg/ha) ali priprava na osnovi ditianona (**Delan 700 WG** 0,75 kg/ha ali **Delan pro** – 2,5 L/ha ali .) ali priprave na osnovi kaptana (**Merpan 80 WDG**–1,88 kg/ha, **Orthocide 80 WG**– 2 kg/ha, **Scab 80 WG**– 1,9 kg/ha, **Scab 480 SC** – 3,13 L/ha).

V primeru, da škropljenje ni bilo opravljeno pred padavinami, je mogoče uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Batalion 450 SC** 0,7-1,0 L/ha, **Chorus 50 WG** - 0,45 kg/ha, **Faban** – 1,2 L/ha, **Mythos** – 1,5 L/ha, **Pyrus 400 SC** – 1L/ha, **Scala** - 1,125 L/ha) ali IBE pripravke (**Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ali **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Domark 100 EC** (0,4 L/ha)). Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku **Faban**.

V nekaterih nasadih opažamo močan pojav **jablanove pepelovke** (še posebej na sortah 'Idared', 'Jonagold'...). V teh nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna priporočamo uporabo sledečih fungicidov: **Luna experience** (0,25 L/m višine krošnje, maks. 0,75 L/ha), **Sercadis** (0,25 L/ha), **Sercadis plus** (0,72 L/ha, (Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup)), **Stroby WG** (0,2 kg/ha), **Zato WG**, **Flint** (0,15 kg/ha) ali **Tercel** (2,5 kg/ha). V močno okuženih nasadih s pepelovko priporočamo vsaj dvojje škropljenje z zgoraj omenjenimi pripravki v razmiku 14 dni.

V ostalih manj okuženih nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo dodajane enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol-Sulphur 800 SC** oz. **Symbiotica Fito** – **tekoče žveplo** v odmerku 3 kg oz. L/ha.

V nekaterih nasadih se pojavljajo listne uši. V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti po končanem cvetenju **Calypso 480 SC** v 0,2% konc. maks. 0,3 L/ha ali **Mospilan 20 SG** v 0,4 kg/ha ali **Movento 100 SC** v odmerku 1,9 l/ha, ki ga je mogoče uporabiti sočasno še za zatiranje ameriškega kaparja, krvave uši in jablanove hrčice.

Po modelu **Maryblyt** pogoji za okužbe s **hruševim ožigom** – so bili pogoji za cvetno okužbo izpolnjeni 29.4. na samo na lokacijah Maribor, Stara nova vas in Zbigovci. O poteku inkubacijske in pojavi bode bolezenskih znakov vas bomo obveščali v naslednjih obvestilih.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 30.04.2020 15:33

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

