

### 36. VARSTVO SOLATNIC PRED LISTNIMI UŠMI - 11.05.2020 10:27 - Zaključeno



□ Ob toplem vremenu so se v nekaterih posevkih solate začele pojavljati **listne uši**, zlasti zelena krompirjeva uš. Priporočljivo je najmanj enkrat tedensko pregledovanje posevkov od roba njive, kjer se populacije uši najprej naselijo. V kolikor so rastline v razvojni fazi tik pred formiranjem glave in število uši na posamezno rastlino presega 20, je priporočljiva raba insekticida. Na prostem lahko za zatiranje listnih uši v solati uporabite sredstva: **Mospilan 20 SG**, **Sivanto Prime**, **Closer**, **Movento SC 100** in **Pirmior 50 WG**. Uporaba slednjih dveh pripravkov je dovoljena tudi v zavarovanih prostorih. V ekološki pridelavi sta za zatiranje listnih uši na voljo **Biotip floral** na osnovi piretrina in **Naturalis** na osnovi glive *Beauveria bassiana*.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 11.05.2020 10:27

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

