

39. VARSTVO VINSKE TRTE - 13.05.2020 14:10 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Vinska trta zelo hitro prirašča. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 17 - 18, ko je razprtih 7 do 8 listov, madice pa so v povprečju dolge okoli 30 -35 cm. Na izpostavljenih legah sorta Chardonnay že dosega dolžino mladice 45 do 50 cm. Sorte kot so počasnejše v razvoju kot je Laški rizling, Sauvignon, pa imajo mladice dolge od 20 – 25 cm in razvitih od 6 do 7 listov (BBCH 16 – 17).

Peronospora in oidij vinske trte

Med 12. in 13. majem je na opazovanih vinogradniških lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 9 mm (Gabrnik); 10,2 mm (Slovenske Konjice); 13 mm (Virštanj) do 15,8 mm dežja (Bistrica ob Sotli).

Vremenska napoved napoveduje nadaljevanje nestanovitnega vremena. V primeru obilnejših padavin lahko pričakujemo izpolnjene za primarno okužbo s peronosporo vinske trte. V primer, da pred padavinami 12.-13. maj še niste opravili škropljenja, to storite čimprej.

Škropljenje proti peronospori opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so:

Delan pro (3 L/ha); **Polyram DF** (2,4 kg/ha); ali s pripravki na osnovi aktivne snovi folpet kot so: **Folpan 80 WDG** (1,25 kg/ha), **Follow 80 WG** (1,25 kg/ha); ali uporabite pripravke, ki poleg folpteta vsebujejo a. s. ciazofamid kot so: **Daimyo F**, **Vincy F**, **Videryo F** v odmerku 2,5 L/ha; ali uporabite pripravek, na osnovi a.s. ciazofamid kot je **Mildicut** (2 L/ha); ali opravite škropljenje s pripravki na osnovi a. s. mankozeb kot so: **Avtar 75 NT**, **Dithane DG Neotec**, **Dithane M-45**, **Manfil Plus 75 WG**, **Mankoz 75 WG**, **Penncozeb 75 DG** ali **Pinozeb M – 45** v odmerku 2 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravek, ki poleg mankozeba vsebuje a.s. zoksamid kot je **Electis 75 WG** (1,5 - 1,8 kg/ha).

Za zatiranje **oidija vinske trte** dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:

Cosan, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus**, **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 8 kg/ha.

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto naštetih pripravkov uporabo pripravka **Universalis** (2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek **Karathane Gold 350 E C** (0,5 L/ha), **Kussabi 300 SC** (0,15 L/ha) ali **Spirox – D** (0,5 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje peronospore.

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi folpet kot so: **Folpan 80 WDG** ali **Follow 80 WG**.

Datum objave obvestila: 13.05.2020 14:10

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

