

60. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 25.05.2020 14:26 - Zaključeno



Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napovedanih padavinah se bo nevarnost okužb še dodatno povečala.

**Fuzarioze žit v pšenici zatiramo v fazi začetka cvetenja žit, ko opazimo prašnike v sredini klasa, pri ječmenu v začetku klasenja.**

Za zatiranje fuzarioz žit so registrirani sledeči pripravki:

AKTIVNA SNOV	PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA
benzovindiflupir+protiokonazol	Elatus Era (p, pr)	1 l/ha	42 dni
spiroksamin + tebukonazol + triadimenol (poraba zalog do 28.2. 2021)	Falcon EC 460 (p)	0,6 l / ha	35 dni
tebukonazol	Folicur EW 250 (p)	1 l/ha	42 dni
epoksikonazol + fenpropimorf (poraba zalog do 30. 10. 2020)	Opus 1 (p, j, o, r, pr, t)	1 – 1,5 l / ha	35 dni
azoksistrobin + ciprokonazol	Mirador xtra (staro Amistar Extra )(p)	0,6 – 1 l/ha	45 dni
tiofanat-metil	Topsin-M (p,t)	1,1 kg/ha	42 dni
metkonazol	Sirena (p)	1,5 l/ha	35 dni
	Plexeo (p)	1,5 l/ha	35 dni
	Caramba (p)	1,5 l/ha	35 dni
protiokonazol + tebukonazol	Prosaro (p, r, t)	1 l/ha	35 dni
tebukonazol	Tebusha 25 % EW (p)	1 l/ha	35 dni
	Orius (p)	1 l/ha	Čas uporabe
	Baltazar (p)	1 l/ha	42 dni
	Buzz Ultra (p)	0,33 kg/ha	35 dni
	Star Tebukonazol (j, t, r)	1 l/ha	42 dni
Bounty (p)	0,6 l/ha	35 dni	
biksafen + tebukonazol	Zantara (p, j, r, t)	1,5 l/ha	35 dni
biksafen + protiokonazol	Siltra xpro	1 l/ha	Čas uporabe
biksafen+ fluopiram + protiokonazol	Ascra xpro (p, t)	1,5 l/ha	Čas uporabe
difenokonazol+tebukonazol	Magnello (p)	1 l/ha	Čas uporabe
prokloraz + tebukonazol	Zamir (p)	1,5 l/ha	35 dni
azoksistrobin	Tazer 250 SC (p)	0,8 l/ha	35 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

**Žitne uši** - Prag za zatiranje žitnih uši v času cvetenja znaša 5-8 uši na klas, v **sredini mlečne zrelosti pa do 10 uši na klas**. Za zatiranje žitnih uši lahko uporabimo:

AKTIVNA SNOV	PRIPRAVEK	ODMEREK	KARENCA
beta-ciflutrin	Bulldock EC 25 (p, j, o, t, r)	0,3 – 0,5 l/ha	21 dni
lambda-cihalotrin	Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r)	0,15 l/ha	30 dni
lambda-cihalotrin	Kaiso EG (p, j, o, t, r)	150 g/ha	30 dni
lambda-cihalotrin	Sparviero (p, j, t, r) poraba zalog 12.1.2021	0,075 l/ha	28 dni
	Karis 10 CS (p, j, o)	50 ml/ha	Čas uporabe
pirimikarb	Pirimor 50 WG (p, j, o, t, r)	0,3 kg / ha	35 dni
deltametrin	Decis 2,5 EC (p, j, o, t, r)	0,2 – 0,3 l/ha	30 dni
	Decis 100 EC (p, j, o)	63 ml/ha	30 dni
alfa- cipemetrin	Fastac 100 EC (p, j, o, t, r)	0,125 l/ha	21 dni
flonikamid	Teppeki(p, t, r)	0,14 kg/ha	28 dni
tau-fluvalinat	Mavrik 240 (p, j)	0,2 l/ha	28 dni
	Evure (p, j, o, t, r)	0,2 l/ha	28 dni (p, r, t), 49 dni (j, o)
tiaklopid	Biscaya (p, j, o, r, t)	0,3 l/ha	Čas uporabe
deltametrin	Poleci (p, j, o, t, r)	0,2 -0,3 l/ha	30 dni
dimetoat (poraba zalog 30.6. 2020)	Perfekthion (p, r, t)	0,5 l/ha	56 dni

(p – pšenica, j - ječmen, o – oves, t – tritikala, r – rž, pr - pira)

Pred uporabo posameznih fitofarmaceutskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenju evidenc o uporabi fitofarmaceutskih sredstev.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 25.05.2020 14:26

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MIKLAVC Jože

Pripravil: **Jože Miklavc**

Seznam registriranih FFS

