



## 53. VARSTVO KROMPIRJA - 04.06.2020 13:41 - Zaključeno



Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so krompirjevi nasadi sedaj bujni in lepi. Znamenj krompirjeve plesni za sedaj še nismo zasledili. Tudi koloradskega hrošča je v nasadih še malo, večinoma opažamo odrasle hrošče in odložena jajčeca, ličinke so navzoče v manjšem obsegu.

Ob nadaljevanju nestalnega vremena s padavinami se nadaljujejo razmere, ki so ugodne za razvoj krompirjeve plesni.

Pridelovalcem priporočamo, da nasade zavarujete s fungicidom, v kolikor tega še niste storili. Škropljenje opravite čimprej po dežju.

Priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemskim delovanjem kot so **Infinito** (karenca 7 dni), **Proxanil 450 CS** (karenca 14 dni) ali pripravek **Ridomil gold MZ pepite** (karenca 21 dni). Ridomil svetujemo samo za prvo škropljenje, pred pojavom plesni kjerkoli v območju pridelave, kasneje pa ne več zaradi nevarnosti razvoja odporne plesni. Uporabite lahko tudi fungicida **Ranman top** ali **Orvego** (karenca 7 dni), ki sta manj podvržena izpiranju ali katerega od fungicidov z delnim sistemskim oz. translaminarnim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (**Acrobat MZ WG**, **Forum MZ WG**, **Banjo forte** vsi imajo karenc 7 dni), mandipropamidom (**Pergado MZ**, **Gett** - oba s karenc 7 dni in **Revus** s karenc 3 dni), cimoksanilom (**Moximate**, **Reboot** s karenc 7 dni, **Nautile**, **Equation pro** s kartenco 14 dni, in drugi) ali valifenalatom (**Valis M**, s karenc 7 dni). V nasadih zgodnjega krompirja bodite pozorni na karence, spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča!

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 04.06.2020 13:41

Obvestilo prognoističnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

