

60. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.06.2020 15:06 - Zaključeno



Vinska trta pričenja s cvetenjem (60 – 63 po lestvici BBCH).

Vinogradnike obveščamo, da ob spremenljivih vremenskih razmerah nevarnost okužb s *peronosporo vinske trte* narašča. Za varstvo vinogradov dajemo prednost kombiniram pripravkom kot so **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **ARMETIL M** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha; staro ime Ridomil Gold Combi Pepite), **FORTUNA GOLD** (3 kg/ha), **FUDAN GOLD** (3 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** ali **WP** (v času cvetenja 1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (v času cvetenja 1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (v času cvetenja 2 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha; priporočeno dodati še dotikalni pripravek), **TWINGO** (3 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **VALIS M** (2 kg/ha), **REVUS** (0,6 l/ha),... Pri uporabi sredstev na osnovi AI – fosetila: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), **ALLEATO DUO** (odmerek 2 – 3 kg/ha do nastavka plodičev); odsvetujemo dodajanje listnih gnojil na osnovi kovinskih ionov; njihova raba je predvidena 3 × zaporedoma.

Povečuje se tudi nevarnost okužb z *oidijem vinske trte*. Uporabite lahko: **LUNAMAX** (1 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **CUSTODIA** (0,35 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (med cvetenjem 0,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha)... Smiselno je tudi dodajanje **PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA**.

Razmiki med tretiranjmi naj bodo v tem obdobju zaradi hitrih prirastov na 7 do 8 dni.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.06.2020 15:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

