



69. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.7 - 15.06.2020 14:37 - Zaključeno



Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitreje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 65 (polno cvetenje).

Pogoste padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s **peronosporo vinske trte**, povzročile pa so tudi izpiranje škroplilne obloge kontaktnih pripravkov.

Za naslednje škropljenje proti **peronospori vinske trte** priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Aleato 80 WG** (2,5 kg/ha) ali **Aleato duo** (2-3 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Armetil M** (2,5 kg/ha) ali **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali **Fortuna gold** (3 kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Fudan Gold** (3 kg/ha) ali **Galben M** (2,5 kg/ha) ali **Gett** (2,5 kg/ha) ali **Magma Triple WG** (3 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Moximate 725 WG** oz. **WP** (1,9 kg/ha) ali **Moximate plus** (1,9 kg/ha) ali **Nautile DG** (2,4 kg/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado F** (3 kg/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Profilux** (2 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Sanvino** (0,75 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha) ali **Valis M** (2 kg/ha). Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka **LBG-01F34** ali **Sorale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet* ali *mankozeb*).

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (3 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Aleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Nevarnost za pojav **oidija vinske trte** se z otoplitvijo vremena povečuje. Trenutno se oidiag indeks giblje med 35 pa vse do 68 (na lokaciji Litmerk); vrednost 66 in več pa predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Custodia** (0,35 L/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Falcon EC 460** (0,4 L/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,5 l/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Prosper CS 300** (1 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha) ali **Systhane 20 EW** (0,14 L/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 l/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Topaze** (0,3 l/ha) ali **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava

fitotoksičnosti.

Trenutno v vinogradih najdemo predvsem ličinke drugega (L2) stadija **ameriškega škržatka** – prenašalca zlate trsne rumenice. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash, Mikal premium F in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 15.06.2020 14:37

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

